

本系共有 8 种,产于我国。

65. 川甘槭(植物分类学报) 季川槭(植物分类学报) 图版 54: 1

Acer yui Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 9: 235, f. 22. 1934 & 11: 120. 1939.

65a. 川甘槭(原变种)

Acer yui Fang var. *yui*

落叶乔木,高约 7 米。树皮灰褐色或深灰色,纵裂。小枝细瘦,无毛;当年生枝淡紫色或淡紫绿色;多年生枝褐色或灰褐色,有卵形或近于圆形的皮孔。冬芽顶生或腋生,椭圆形,淡褐色或淡黄色;鳞片多数,覆叠,边缘有纤毛,叶纸质,阔卵形,基部近于圆形或钝形,长 5—7 厘米,宽 3.5—5.5 厘米,3 裂,裂片边缘全缘或微呈浅波状;中裂片长圆披针形或披针形,先端钝尖,在裂片中部以下、两侧的边缘常系平行的,侧裂片三角卵形,先端钝尖,向侧面平伸;裂片间的凹缺钝尖,深达叶片的 $\frac{3}{5}$ — $\frac{1}{3}$;上面深绿色,无毛,平滑,下面淡黄色或黄绿色,在脉腋被淡灰色或淡黄色的短柔毛;初生脉 3 条,在上面不显著,在下面凸起;侧脉 5—7 对,在下面显著;小叶脉成网状;叶柄长 3—4 厘米,淡紫色或紫绿色,细瘦,近顶端有短柔毛,以下几无毛。花的特性未详,翅果淡黄褐色,3—5 个组成伞房果序,生于长 5—7 毫米的总果梗上,小坚果凸起,卵圆形,长 7 毫米,宽 5 毫米,脉纹显著,被黄褐色微柔毛;翅与小坚果共长 2.1—2.4 厘米,宽 1 厘米,倒卵形,先端钝形,展开成钝角;果梗细瘦,长 3—5 毫米。花期不明,果期 9 月。

产甘肃东南部和四川西北部。生于海拔 1800—2000 米的林中或溪边。模式标本采自四川南坪。

本种的叶深裂,中央裂片长圆披针形,且在中段以下两侧几成平行,侧裂片钝形,向侧面平伸,为本种最显著的特征。

65b. 瘦果川甘槭(变种)(植物分类学报) 图版 54: 2

Acer yui Fang var. *leptocarpum* Fang et Wu in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 79, 1979.

本变种与原种的区别在于叶比较细瘦,长 3—4.5 厘米,宽 2—3.5 厘米,基部近于圆形或钝形,中段以上 3 裂,裂片钝尖,侧裂片向上直伸,较小或稀不发育,叶柄较短,仅长 1.5—2 厘米,伞房果序淡紫色,较长,常长 5 厘米,翅果比较细瘦,翅宽 4—6 毫米,连同卵圆形的小坚果长 2—2.2 厘米,张开成钝角或近于水平。花期不明,果期 9 月。

产四川西北部。生于海拔 1550 米的溪旁林边。模式标本采自南坪县安乐沟。

66. 三角槭(经济植物手册) 三角枫(植物名实图考) 图版 55: 1

Acer buergerianum Miq. in Ann. Mus. Lugd.-Bat. 2: 88 (Prol. Fl. Jap. 20) 1865; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 121. 1939.—*A. trifidum* sensu Hook. et Arn. Bot. Voy. Beech. 174. 1841, non



1. 川甘槭 *Acer yui* Fang: 果枝。2. 瘦果川甘槭(变种) *Acer yui* Fang var. *leptocarpum* Fang et Wu: 果枝。(冯先洁绘)