

不明,果期9月。

产我国台湾北部至中部。生于沿海疏林中。模式标本采自基隆。

66e. 界山三角槭(变种)(植物分类学报)

*Acer buergerianum* Miq. var. *kaiscianense* (Pamp.) Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 127. 1939. — *A. trifidum* var. *kaisci-anensis* (sic) Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. II. 11: 127. 1911.

本变种与原种的区别在于本变种的叶外貌近于圆形,下段圆形,上段深3裂;翅果较小,翅宽7毫米,连同小坚果长1.8—2厘米,张开成钝角。花期不明,果期9月。

产湖北西北部、陕西南部和甘肃东南部。生于海拔1000—1500米的山坡疏林中。模式标本采自湖北武当山脉中的界山。

66f. 雁荡三角槭(变种)(植物分类学报)

*Acer buergerianum* Miq. var. *yentangense* Fang et Fang f. in Act. Phytotax. Sin. 11: 164. 1966.

本变种较之原种区别在于本变种的叶较小,仅长3厘米,宽3.5厘米,下面有白粉,下段近于圆形,上段3裂,裂片卵形,翅果较小,常单生,翅连同小坚果长1.5—1.8厘米,张开成钝角。花期不明,果期9月。

产浙江中部。生于海拔700—900米的山坡疏林中。模式标本采自天台山。

67. 福州槭 君范槭(植物分类学报) 图版53: 2

*Acer lingii* Fang in Act. Phytotax. Sin. 11: 165. 1966.

落叶乔木,树皮粗糙,暗褐色。小枝圆柱形,当年生嫩枝淡紫色,密被灰色绒毛,多年生老枝无毛,具淡黄色椭圆形皮孔。冬芽卵圆形,鳞片锐尖,边缘纤毛状,覆叠。叶薄纸质,中段以下常呈半圆形,基部圆形,上段3裂,裂片钝尖,裂片间的凹缺钝尖,边缘微呈浅波状。长5—6.5厘米,宽5—6厘米,上面绿色,干后淡黄绿色,无毛,下面略被白粉及很稀疏的灰色疏柔毛;初生脉3条,在上面稍显著,在下面凸起,直达于裂片的先端,侧脉12—13对,细瘦,略向内弯曲,在两面均仅略显著,未达于边缘前即隐匿不现,小叶脉网状,略微显著或不显著;叶柄细瘦,淡紫绿色,无毛,长7—8厘米。花的特性未详。果序伞房状,长约5厘米,被稀疏的灰色疏柔毛;果梗细瘦,长1—1.5厘米,小坚果凸起,栗褐色,直径7毫米,翅镰刀形,淡黄紫色,宽1厘米,连同小坚果长2.5厘米,张开近于直立。花期不明,果期9月。

产福建东部。生于山坡疏林中。模式标本采自福州仑前山。

本种与东南各省的三角槭 *A. buergerianum* Miq. 相近,但本种的叶系薄纸质,较大,中段以下略呈半圆形,基部圆形。叶柄(常长7—8厘米)较长于叶片,翅果的翅较大,张开近于直立,易于辨别。

68. 金沙槭 金河槭(植物分类学报), 川滇三角枫(中国树木分类学), 川滇三角槭



1. 河口槭 *Acer fenzelianum* Hand.-Mazz.: 果枝。2. 福州槭 *Acer lingii* Fang: 果枝。3. 角叶槭 *Acer sycopseoides* Chun: 果枝。(冯先洁绘)