

上面绿色,有光泽,很平滑,下面淡白色,略被白粉;主脉在上面显著,在下面凸起,侧脉5—7对,在上面不显著,在下面略显著,未达于边缘以前即隐匿不现,基生的1对常达于叶片的中段,小叶脉不发育;叶柄细瘦,紫绿色,无毛,长1—1.5厘米。花序伞房状,长2—3厘米,被很密的淡黄色绒毛;花梗长5—10毫米,细瘦,被绒毛。花杂性,雄花与两性花同株;萼片5,黄绿色,长圆形,长3毫米,宽1毫米;花瓣5,倒卵状长圆形,与萼片近于等长;雄蕊8,长于花瓣,花丝无毛;花盘微裂,位于雄蕊外侧;子房紫色,无毛,花柱上段2裂,柱头反卷。翅果嫩时淡紫色,成熟时淡黄色;小坚果凸起,近于卵圆形,长7毫米,宽5毫米,翅宽9毫米,连同小坚果长2—2.5厘米,张开成锐角或近于直立。花期3月下旬至4月上旬,果期8—9月。

产广东北部及广西东北部。生于海拔800—1200米的石质山坡疏林中。模式标本采自广东韶关。

77. 剑叶槭(广西植物名录) 披针叶槭(植物分类学报)

Acer lanceolatum Moll. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50 (Ser. IV. vol. 3): 134. f. 5. 1903; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 213. 1907; Metc. in Lingnan Sc. Journ. 11: 197. 1932; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 140. 1939.

常绿小乔木,干细瘦。树皮淡黑色。叶革质,全缘或微呈波状,与樟树的叶相似,披针形,长8—10厘米,宽1.7—2厘米,先端渐尖,具微弯曲的尖头,基部楔形,上面绿色,下面被白粉;叶脉细,基部3条主脉显著,侧脉与主脉相交所成的角度略大于锐角;叶柄长2—2.5厘米,细瘦。花10朵,常成顶生无毛的伞房花序;花盘位于雄蕊外侧;雄蕊8,小坚果长6—7毫米,宽3.5—4毫米;翅长2厘米,宽7毫米,张开近于直角。果梗细长,无毛。花期3月,果期10月。

产广西西部西江流域。

本种的叶狭窄披针形,基部楔形,先端渐尖,具微弯曲的尖头,下面被白粉,叶柄长2—2.5厘米,果实具短翅,仅长2厘米,极易辨别。

本种存在国外的模式标本早已失散。我们尚未在原产区采得可靠的区模式标本。以上的简略叙述是根据原始记载写成的。

78. 紫白槭(植物分类学报)

Acer albo-purpurascens Hayata in Journ. Coll. Sc. Tokyo 30 (1): 64. 1911 & Ic. Pl. Formos. 1: 154. 1911; Metc. in Lingnan Sc. Journ. 11: 203. 1911; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 163. 1939; Li, Wood. Fl. Taiwan 486. 1963. — *A. oblongum* sensu Matsum. et Hayata, Ic. Pl. Formos. 6: 96. 1906, non Wall. ex DC; Koidz. in Journ. Coll. Sc. Tokyo 32 (1): 55. 1911; Kaneh, Formos. Trees, ed. rev. 506, f. 361. 1936.