

深紫色，疏被淡黄色长柔毛；果梗长 2—2.5 厘米，细瘦，紫色。翅果紫色，小坚果凸起，近于卵圆形，长 7 毫米，宽 4 毫米，翅张开成钝角，内弯成镰刀形，中段最宽，常宽 1 厘米，基部渐狭窄，连同小坚果长 3 厘米。花期不明，果期 8—9 月。

产四川东部。生于海拔 800 米的阔叶林中。模式标本采自北碚缙云山。

本种与飞蛾槭 *A. oblongum* Wall. ex DC. 相近，区别在于本种的小枝、叶柄和果实均是紫色，叶系长圆形而先端渐尖，小叶脉不发育，果序较长，常长达 8 厘米，嫩时被淡黄色长柔毛，翅果较大，长 3 厘米，翅张开成钝角。

81. 武夷槭 (植物分类学报)

Acer wuyishanicum Fang et Tan in Act. Phytotax. Sin. 17: 80, Pl. 12:

3. 1979.

常绿乔木，约高 10 米。树皮深褐色，粗糙。小枝褐色或淡紫褐色，无毛，当年生嫩枝微具棱角，直径 2 毫米，皮孔很密，近于圆形，黄色。冬芽锥形、淡褐色，鳞片卵形，无毛，覆叠。叶革质，全缘，长圆形或长圆状椭圆形，常长 6—7 厘米，宽 2—3 厘米，基部近于钝形或圆形，先端短急锐尖，边缘干后微反卷，上面深绿色，下面灰色，微被白粉，主脉在上面显著，在下面凸起，侧脉 5—6 对，常以 40 度的角与主脉叉分，不到边缘即隐匿不现，仅在下面显著，基部的 1 对侧脉几达于叶片的中段，小叶脉常不发育；叶柄长 2—3 厘米，淡紫绿色，无毛。花的特性未详。果序伞房状，紫色，无毛，长 5—6 厘米；果梗仅长 1 厘米。翅果成熟时深黄色；小坚果凸起，长 5 毫米，直径 3 毫米；翅的基部狭窄，中段最宽，宽 7—8 毫米，连同小坚果长 2.3—2.5 厘米，张开成锐角。花期不明，果期 9 月。

沿武夷山脉分布于江西东南部和福建西北部。生于海拔 500—1000 米的疏林中。模式标本采自福建邵武县蕙林。

本种与北培槭 *A. pehpeiense* Fang et Su 相近，区别在于本种的小枝较短，当年生枝仅长 3—4 厘米，叶革质，长圆形，较小，仅长 6—7 厘米，宽 2—3 厘米，干后边缘反卷，果序无毛，较短，约长 6 厘米，翅果较小，长 2.3—2.5 厘米，翅张开成锐角；本种又与将乐槭 *A. laikuanii* Ling 相近，但本种的翅果较大，叶较小而小叶脉不发育。亦易于区别。

82. 将乐槭 (植物分类学报) 来官槭 (植物分类学报)

Acer laikuanii Ling in Act. Phytotax. Sin. 1: 201, fig. 1. 1951.

常绿乔木，高约 10 米。树皮灰色或灰褐色，纵裂。小枝细瘦，圆柱形，当年生嫩枝紫褐色，多年生老枝深褐色，无毛，具很密的皮孔。冬芽卵圆形，紫褐色，长约 2 毫米，有光泽；鳞片多数，卵形，先端急尖，边缘具纤毛。叶革质，全缘，长圆卵形稀卵形，基部近于圆形或钝形，中部以下较宽，先端常突然短渐尖而成钝形的尖头，长 5—9 厘米，宽 2—4 厘米，上面绿色，无光泽，下面苍白色，边缘干后稍反卷；主脉在上面显著，在下面略凸起，基部的 1 对侧脉自叶基部或自近基部 3 毫米处发出，很直，达于叶片的中部，在将达边缘以前分成更细的小脉，在两面均仅微现，其余侧脉 6—7 对，略弯曲，两面均仅微现或在下面