

毫米的尖头；上面深绿色，有光泽，下面灰绿色，微被白粉；主脉在上面显著，在下面凸起，侧脉 8—10 对，在上面不现，在下面微显著；叶柄粗壮，无毛，长 1—2 厘米。花杂性，雄花与两性花同株，常成密被淡黄色长柔毛长 5—6 厘米的伞房花序，总花梗长 1—2 厘米；萼片 5，淡绿色，长圆形或长倒卵形，长 3—3.2 毫米，宽 1.5—1.8 毫米，外侧被长柔毛；花瓣 5，淡黄色，披针形或倒披针形，长 3.3—4 毫米，宽 1—1.2 毫米，先端微凹缺；雄蕊 8，略短于萼片；花盘无毛，位于雄蕊的外侧；子房紫色，被淡黄色长柔毛，花柱很短；花梗细瘦，被淡黄色长柔毛。翅果嫩时紫色，成熟后现黄褐色；小坚果特别凸起，长 1 厘米，直径 6 毫米；翅近顶端部分较宽，基部很窄，最宽处宽约 1 厘米，连同小坚果长 2.8—3.2 厘米，直立。花期 4 月下旬，果期 9 月。

产云南东南部。生于海拔 1000 米的阔叶林中。模式标本采自富宁县龙迈。

88. 滨海槭(植物分类学报) 罗浮槭(植物分类学报) 图版 58: 3

*Acer sino-oblongum* Metc. in Lingnan Sc. Journ. 11: 202. 1932; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 161. 1933.——*A. oblongum* sensu Benth, Fl. Hongkong. 47. 1861, non Wall. ex DC; Maxim. in Bull. Acad. Sc. St. Petersburg. 26: 442 (in Mém. Biol. 10: 599. 1880) 1880; Hemsl. in Journ. Linn. soc. bot. Ser. 23: 141. 1886.


常绿乔木，高约 5—7 米。树皮粗糙，淡灰褐色或深灰色。小枝细瘦，无毛；当年生枝紫色或淡紫绿色；多年生枝淡紫褐色或淡紫色，具卵形或圆形皮孔。冬芽淡褐色，卵圆形；鳞片的边缘微被睫毛。叶革质，全缘，椭圆形或椭圆状长圆形，稀披针形，长 6—9 厘米，宽 2—4 厘米，先端渐尖或长渐尖，基部宽楔形或近于圆形；上面绿色或淡绿色，无毛，下面淡黄绿色，被白粉，主脉在上面显著，在下面凸起，侧脉 5—7 对，很细瘦，在下面略显著，与主脉相交成钝角，分支不达于叶缘；叶柄无毛，长 1—3 厘米。花淡黄绿色，杂性，雄花与两性花同株，常成被长柔毛的顶生伞房花序，总花梗长约 1 厘米，被长柔毛；萼片 5，倒卵状长圆形，长约 4 毫米；花瓣 5，倒披针形，与萼片等长；雄蕊 8，很短，花药卵圆形；花盘位于雄蕊外侧；子房无毛，花柱长约 4 毫米，无毛；花梗长 5—10 毫米，被长柔毛。翅果淡黄褐色；小坚果特别凸起，长 8 毫米，宽 5 毫米；翅与小坚果长 3 厘米，宽 1—1.2 厘米，张开成锐角。花期 4 月，果期 9 月。

产广东东南部沿海地区。生于石质山坡或疏林中。模式标本采自九龙附近。

89. 海拉槭(植物分类学报) 顺宁槭(静生生物调查所汇报)，昌宁槭(植物分类学报) 图版 58: 4

*Acer hilaense* Hu et Cheng in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. II. 1: 203, 210. 1948.

常绿乔木，高 10 米。树皮灰色，粗糙。小枝圆柱形，无毛，当年生枝紫褐色，多年生枝深褐色。冬芽卵圆形；鳞片多数，淡黄色，三角卵形，外侧无毛，边缘具纤毛。叶纸质或近



1—2.厚叶槭 *Acer crassum* Hu et Cheng: 1.果枝; 2.幼嫩小枝的一段放大以示其毛。3.滇海槭 *Acer sino-oblongum* Metc.: 果枝。4.海拉槭 *Acer hilaense* Hu et Cheng: 果枝。(冯先洁绘)