

于革质，长圆形或长圆卵形，长6—8厘米，宽2.2—3厘米，全缘，基部圆形，先端渐尖或短急锐尖，具长1—1.2厘米微弯曲的尖头；上面深绿色，无毛，下面灰绿色被白粉；侧脉8—10对，羽状，在上面微现，在下面显著；叶柄细瘦，紫褐色，长2.5—3厘米，上面现沟纹，下面圆形。花的特性未详。翅果紫褐色，多数常成被灰色短柔毛的伞房状果序，长3.5—4厘米，总果梗长1.5厘米；小坚果特别凸起，卵圆形，直径7毫米，嫩时被淡黄色或灰色短柔毛；翅狭窄，长圆形，宽5—6毫米，连同小坚果长2.4—3厘米，张开成锐角。花期不明，果期9月。

产云南西部。生于海拔2500米的林中。模式标本采自昌宁县海拉山。

90. 天峨槭(广西植物名录) 黄志槭(植物分类学报) 图版59: 1

*Acer wangchii* Fang in Act. Phytotax. Sin. 11: 168. 1966.

90a. 天峨槭(原亚种)

*Acer wangchii* Fang subsp. *wangchii*

常绿乔木，高达15米，胸高直径18厘米。树皮粗糙，深褐色或深紫色。小枝细瘦，常4—5枚生于小枝顶端，嫩时淡紫绿色，后变褐色，无毛，具淡黄色椭圆形皮孔。冬芽卵圆形，鳞片钝尖，覆叠。叶革质，披针形或长圆披针形，长9—11厘米，宽2—3厘米，基部阔楔形，先端渐尖，尖头长1—1.5厘米，常稍弯曲，边缘全缘或稍呈浅波状，上面干后淡绿色，下面略被白粉；主脉在上面稍下凹，在下面显著，侧脉13—15对，细瘦，约以60度的角自主脉叉分，在上下两面均仅微显著，稍向上弯曲，未达于叶的边缘以前即行隐匿不现，小叶脉不发育；叶柄紫绿色或淡紫绿色，无毛，长1.5—2厘米，稀达2.2厘米。花的特性未详。果序伞房状，顶生，长4厘米，被很密的淡黄色绒毛；果梗粗壮，常长1.2—1.5厘米，紫色，被淡黄色绒毛。小坚果紫色，特别凸起，长8—9毫米，宽6毫米，翅镰刀形，初系淡紫色，后变淡黄色，宽1—1.2厘米，连同小坚果长2.2—2.4厘米，张开成锐角。花期不明，果期9月。

产广西北部。生于海拔1500米的阔叶林中。模式标本采自天峨、南丹两县。

90b. 缙云槭(亚种)(植物分类学报) 图版59: 2—3


*Acer wangchii* Fang subsp. *tsinyunense* Fang in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 82, Pl. 13: 1. 1979.

本亚种与原种的区别在于本亚种的叶系纸质，长圆形，长8—10厘米，宽2.5—3厘米，稀达4厘米，先端渐尖或短急锐尖，基部近于圆形，叶柄较长，长3—4厘米；翅果淡紫色，无毛，长2.5—2.8厘米，张开近于锐角。花期不明，果期9月。

产四川东部。生于海拔700—800米的阔叶林中。模式标本采自北碚缙云山。

91. 桉状槭(植物分类学报) 图版60: 1—2

*Acer eucalyptoides* Fang et Wu in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 83 Pl. 13: 4. 1979.



1.天峨槭 *Acer wangchii* Fang: 果枝。2—3.缙云槭(亚种) *Acer wangchii* Fang subsp. *tsinyu-nense* Fang: 2.果枝; 3.嫩枝的一段放大以示其毛。(冯先洁绘)