

92b. 怒江光叶槭(变种)(植物分类学报)

Acer laevigatum Wall. var. *salweenense* (W. W. Smith) J. M. Cowan ex Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 172. 1939.——*A. salweenense* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 13: 151. 1921.

本变种与原种的区别在于本变种的花序总轴、花梗和叶柄均被黄色长柔毛;嫩时更密,渐老则陆续脱落成无毛状。花期不明,果期9月。

产云南东南部和西南部。生于海拔1000—2500米的山谷疏林中。缅甸东北部也有分布。模式标本采自云南怒江流域。

93. 罗浮槭(广西植物名录) 红翅槭(静生生物调查所汇报) 图版61: 2

Acer fabri Hance in Journ. Bot. Brit. & For. 22: 76. 1884; Metc. in Lingnan Sc. Journ. 11: 204. 1932, pro parte; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 150. 1939.——*A. laevigatum* subsp. *reticulatum* (Champ.) E. Murr. Kalmia 8: 6. 1977, pro parte.

93a. 罗浮槭(原变种)


Acer fabri Hance var. *fabri*

常绿乔木,常高10米。树皮灰褐色或灰黑色,小枝圆柱形,无毛,当年生枝紫绿色或绿色,多年生枝绿色或绿褐色。叶革质,披针形,长圆披针形或长圆倒披针形,长7—11厘米,宽2—3厘米,全缘,基部楔形或钝形,先端锐尖或短锐尖;上面深绿色,无毛,下面淡绿色,无毛或脉腋稀被丛毛;主脉在上面显著,在下面凸起,侧脉4—5对,在上面微现,在下面显著;叶柄长1—1.5厘米,细瘦,无毛。花杂性,雄花与两性花同株,常成无毛或嫩时被绒毛的紫色伞房花序;萼片5,紫色,微被短柔毛,长圆形,长3毫米;花瓣5,白色,倒卵形,略短于萼片;雄蕊8,无毛,长5毫米;子房无毛,花柱短,柱头平展 翅果嫩时紫色,成熟时黄褐色或淡褐色;小坚果凸起,直径约5毫米;翅与小坚果长3—3.4厘米,宽8—10毫米,张开成钝角;果梗长1—1.5厘米,细瘦,无毛。花期3—4月,果期9月。

产广东、广西、江西、湖北、湖南、四川。生于海拔500—1800米的疏林中。模式标本采自广东罗浮山。

罗浮槭的变种检索表

1. 叶较小,仅长4—6厘米;翅果较小,长度在3厘米以内。
 2. 叶近于披针形,长4.5—6厘米,宽1.5—2厘米,上面有光泽;翅果长2.5—3厘米,常系红色(长江中上游至华南各省)。…………… 93b. 红果罗浮槭(变种) *A. fabri* Hance var. *rubrocarpum* Metc.
 2. 叶长圆卵形或近于椭圆形,长4—4.5厘米,宽2—2.5厘米,纤瘦无光泽;翅果长1.8—2厘米(广东)。…………… 93c. 特瘦罗浮槭(变种) *A. fabri* Hance var. *gracillimum* Fang
1. 叶较大,长7—11厘米;翅果较大,长3—4.8厘米。
 3. 叶披针形或倒披针形;翅果长3—3.4厘米(华南至长江中上游各省)。……………



1. 光叶槭 *Acer laevigatum* Wall.: 果枝。2. 罗浮槭 *Acer fabri* Hance: 果枝。(蔡淑琴绘)