

Acer kwangnanense Hu et Cheng in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. II. 1: 204, 211. 1948. — **A. fengii** E. Murr. Kalmia 8: 6. 1977.

常绿乔木，高达15米。树皮深褐色或深灰色，粗糙。小枝无毛，当年生枝紫褐色，略呈四棱形，多年生枝深褐色或深灰色，具显著的皮孔。冬芽卵圆形；鳞片多数，外部者长圆卵形，外侧无毛，边缘纤毛状。叶革质，长圆形或长圆椭圆形，长8—14厘米，宽3.5—4.2厘米，稀达6.1厘米，基部钝形或阔楔形，稀近于圆形，先端钝尖或短渐尖，具长8—10毫米，微弯曲的尖头；上面深绿色，无毛，下面淡绿色，无毛；主脉在上面显著，在下面凸起，侧脉7—9对，在上面微现，在下面显著，由基部生出1对侧脉较之其余的侧脉并不特别长些；叶柄长2—4厘米，淡红色，上面微现沟纹。花的特性未详。翅果淡黄褐色，常成被淡黄色短柔毛的伞房果序，长3—4厘米，总果梗长1.5—2厘米；小坚果特别凸起，长1厘米，宽6毫米；翅直立，中段最宽，常宽1.2—1.4厘米，先端圆形，基部狭窄，连同小坚果长约4—4.2厘米；果梗细瘦，长1—1.4厘米。花期不明，果期9月。

产云南东南部。生于海拔1000—1500米的疏林中。模式标本采自广南。

96. 网脉槭(植物分类学报)

Acer reticulatum Champ. in Hook. Kew Journ. 3: 312. 1851; Seem. Bot. Voy. Herald. 368, t. 80. 1852—57; Benth. Fl. Hongkong. 47. 1861; Metc. in Lingnan Sci. Journ. 11: 208. 1932, pro parte; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 159. 1939. — **A. laevigatum** var. **reticulatum** (Champ.) Rehd. in Sargent, Trees & Shrubs 1: 180. 1905. — **A. laevigatum** subsp. **reticulatum** (Champ.) E. Murr. Kalmia 8: 6. 1977, pro parte.

96a. 网脉槭(原变种)

Acer reticulatum Champ. var. **reticulatum**

常绿灌木或小乔木，高约5米。树皮灰色或深灰色。小枝圆柱形，无毛；当年生枝绿色或淡绿色；多年生枝淡灰绿色或淡黄绿色。冬芽卵圆形，淡紫绿色；鳞片被淡白色的短柔毛。叶厚革质，全缘，长圆椭圆形或长圆披针形，长7—10厘米，宽3—4厘米，先端渐尖或短渐尖，基部宽楔形或近于圆形；上下两面均淡绿色，网脉均很显著，有光泽；主脉凸起很显著；侧脉8—9对，略微凸起，嫩时脉腋被簇生的棕色丛毛，渐老无毛，小叶脉网状，在两面均显著；叶柄长1—1.5厘米，无毛，上面微现沟槽。花杂性，雄花与两性花同株，成伞房花序，无毛，长约2厘米，直径3厘米，总花梗长2—3厘米，顶生于具叶的小枝上，嫩叶开出后花始开放；萼片5，淡紫绿色，卵形或卵状长圆形，先端钝圆，边缘微被睫毛，长约2毫米；花瓣5，白色，匙形，先端现凹缺，比萼片长；雄蕊8，无毛，长约6毫米，花药球形，黄色；花盘位于雄蕊的外侧，近于无毛；子房微被短柔毛，花柱短；花梗长5—8毫米，细瘦，无毛，嫩时淡紫绿色，长大时淡黄绿色；小坚果凸起，球形，直径约6—8毫米；翅与小坚果长2.5—3厘米，宽1—1.2厘米，张开成钝角；果梗长约1.5—2厘米，细瘦，无毛。花期