

序淡紫色,果梗长1厘米,翅果淡紫色,较小,长1.8—2厘米,张开成钝角。花期不明,果期9月。

产我国西藏南部。生于海拔2600米的山坡疏林中。模式标本采自错那。

102. 锡金槭(植物分类学报)

*Acer sikkimense* Miq. in Arch. Néerl. 2: 471. 1867; Pax in Engl. Pflanzenreich 8 (IV. 163): 34. 1902; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 177. 1939.——*A. sikkimense* var. *subintegrum* Schwer. in Gartenflora 42: 229. 1893; Pax, op. cit. 8 (IV. 163): 34. 1902.

102a. 锡金槭(原变种)

*Acer sikkimense* Miq. var. *sikkimense*

落叶乔木,高10—15米。树皮深灰色。小枝细瘦,无毛;当年生枝紫绿色或绿色;多年生枝黄褐色或黄绿色,稀深灰色。冬芽紫色或深紫色,椭圆形。叶革质或厚纸质,长圆卵形,长9—12厘米,宽5—6厘米,基部心脏形或近于心脏形稀圆形,先端锐尖稀钝尖,具尾状尖尾,全缘或近先端有紧密的锐尖细锯齿;上面深绿色,干后现紫绿色,下面淡绿色,无毛;主脉及5—6对侧脉在上面微现,在下面略凸起;叶柄绿色或紫绿色,长2—3厘米,比较粗壮。花黄绿色,单性,雌雄异株,约40—50朵组成长6—8厘米的总状花序,总花梗长1—1.5厘米,生于着叶的嫩枝顶端,叶已长大后花始开放;萼片5,长圆卵形,先端钝圆,长约3毫米;花瓣5,与萼片等长;雄蕊8,与花瓣等长或略长于花瓣,在雌花中不发育,花药黄色,近于球形,花丝细瘦,无毛;花盘无毛,微裂,位于雄蕊的内侧;子房无毛,深紫色,在雄花中不发育,花柱很短,柱头平展或略反卷;花梗长约2毫米,细瘦,无毛。翅果嫩时深紫色,成熟后黄褐色,35—45个果实常成长13—15厘米的下垂总状果序;小坚果扁圆形,长7毫米,宽5毫米;翅镰刀形,略向外反卷,中段较宽,连同小坚果长2.3—2.5厘米,宽7毫米,张开近于直角或锐角;果梗细瘦,长2—3毫米。花期4月,果期9月。

产我国西藏南部。生于海拔2500—3000米的林中。锡金、印度北部和缅甸北部也有分布。模式标本采自锡金。

102b. 细齿锡金槭(变种)(植物分类学报) 图版65: 3—4

*Acer sikkimense* Miq. var. *serrulatum* Pax in Bot. Jahrb. 7: 215. 1886 & in Engl. Pflanzenreich 8 (IV. 163): 34. 1902; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 178. 1939.

本变种较之原种区别在于本变种叶的边缘有紧密锐尖的细锯齿,翅果常张开成钝角。花期4月,果期9月。

产云南和西藏南部。生于海拔2000—3300米的丛林中。锡金和缅甸北部也有分布。模式标本采自锡金。

103. 尖尾槭(植物分类学报)