

组 2. 七叶树组——Sect. 2. *Aesculus*

乔木，高达 30 米，冬芽有树脂。掌状复叶有 5—7 枚无柄的小叶。花序宽大，常长不逾 30 厘米。花白色，花瓣的爪和其脉纹在开花时常由黄色变成红褐色；花萼钟形，5 裂；花瓣 4 或 5，宽大，各花瓣大小近于相等，均反卷，爪部短于花萼；雄蕊伸出花外，花药有腺体。蒴果有刺或瘤状凸起。

本组的模式种：欧洲七叶树 *A. Hippocastanum* Linn.

本组仅有 2 种：欧洲 1 种，日本 1 种。我国均已引种栽培。

10. 欧洲七叶树(中国树木分类学)

Aesculus hippocastanum Linn. Sp. Pl. 344. 1953; Schneider, Ill. Handb. Laubh. 2: 246, f. 171a, 172. 1909; Hardin in Brittonia 12: 32. 1960.

落叶乔木，通常高达 25—30 米，胸高直径 2 米。小枝淡绿色或淡紫绿色，嫩时被棕色长柔毛，其后无毛。冬芽卵圆形，有丰富的树脂。掌状复叶对生，有 5—7 小叶；小叶无小叶柄，倒卵形，长 10—25 厘米，宽 5—12 厘米，先端短急锐尖，基部楔形，边缘有钝尖的重锯齿，上面深绿色，无毛，下面淡绿色，近基部有铁锈色绒毛，主脉凸起，侧脉约 18 对，在两面均显著；叶柄长 10—20 厘米，无毛。圆锥花序顶生，长 20—30 厘米，基部直径约 10 厘米，无毛或有棕色绒毛。花较大，直径约 2 厘米；花萼钟形，长 5—6 毫米，5 裂，边缘纤毛状，外侧有绒毛；花瓣 4 或 5，长 11 毫米，白色，有红色斑纹，爪初系黄色，后变棕色，外侧有稀疏的短柔毛，边缘有长柔毛，中间的花瓣和其余 4 花瓣等长或不发育；雄蕊 5—8，生于雄花者较长，长 11—20 毫米，花丝有长柔毛，花药被短柔毛；雌蕊有长柔毛，子房具有柄的腺体。果实系近于球形的蒴果，直径 6 厘米，褐色，有刺长达 1 厘米；种子栗褐色，通常 1—3 粒，稀 4—6 粒，种脐淡褐色，约占种子面积的 1/3 至 1/2。花期 5—6 月，果期 9 月。

原产阿尔巴尼亚和希腊。我国引种，在上海和青岛等城市都有栽培。

本种的树冠广阔，可作行道树和庭园树。木材良好可制造各种器具。

11. 日本七叶树(中国树木分类学)

Aesculus turbinata Bl. Rumphia 3: 195. 1847; Bean in Curtis's Bot. Mag. 143: t. 8713. 1917; Hardin in Brittonia 12: 32. 1960.—*A. chinensis* Hort. ex Schneider, Ill. Handb. Laubh. 2: 246. 1909, non Bunge 1833, pro syn.—*A. japonica* Hort. ex Schneider in op. cit. 1909, pro syn.—*A. sinensis* Hort. ex Bean op. cit. pro syn.—*A. turbinata* var. *pubescens* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 3: 219. 1922.

落叶乔木，通常高达 30 米，胸高直径 2 米。小枝淡绿色，当年生者有短柔毛。冬芽卵形，有丰富的树脂。掌状复叶对生，有小叶 5—7 枚；小叶无小叶柄，倒卵形，长圆倒卵形至倒卵状椭圆形，长 20—35 厘米，宽 5—15 厘米，中间的小叶较其余的小叶大 2 倍以上，先端