

产广东海南岛各地和雷州半岛。生低海拔至中海拔地区的林下或灌丛中。越南北部也有分布。模式标本采自海南岛。

根药用,可治痢疾。

5. 波叶异木患(植物分类学报)

Allophylus caudatus Radlk. in Sitzungsab. Math. Phys. Akad. Wiss. München **38**: 231. 1909 et in Engler, Pflanzenr. **98** (IV. 165): 582. 1932; H. S. Lo et T. Chen in Acta Phytotax. Sinica **17**: 30. 1979. — *A. racemosus* auct. non (Linn.) Radlk.: Chun in Sunyatsenia **4**: 238. 1940 How et Ho in Acta Phytotax. Sinica **3**: 379. 1955.

小乔木或大灌木,高通常不超过5米;小枝有透镜状、稍密集的皮孔,被短柔毛。三出复叶;叶柄长6—12.5厘米;小叶膜质或薄纸质,顶生的长圆状披针形,长8—22厘米或更长,宽约3.5—7.5厘米,顶端尾状长尖,基部楔形,侧生的较小,卵形,两侧极不对称,基部阔楔形至近圆形,边缘有浅波状粗齿,腹面沿中脉上被毛,背面近无毛;侧脉约10对,两面突起;小叶柄长5—15毫米。花序总状,主轴不分枝,极少基部有1细长分枝,比叶长,有时与叶柄近等长或稍长,花序轴细瘦,末端常俯垂,总花梗长1.5—2.5厘米;花梗长1毫米;花瓣狭楔形,鳞片深2裂;花盘近无毛;花丝下部被长柔毛。果近球形,直径7—8毫米,红色。花期8—9月,果期9—11月。

产广西南部和云南东南部(河口、马关)。常生林中或灌丛中。越南北部为模式标本产地。

6. 滇南异木患(新拟)

Allophylus cobbe (Linn.) Raeusch. var. **velutinus** Corner in Gard. Bull. Str. Settl. **10**:41. 1939; 云南植物志 **1**:256,图版60(4—5)。1977。

灌木,高1.5—3米;小枝圆柱状,灰褐色,具圆形小皮孔,嫩枝多少被毛。三出复叶;叶柄长5—11厘米,被微柔毛;小叶薄纸质,顶生小叶椭圆形或椭圆状披针形,长9—20厘米,宽4—6.5厘米,侧生小叶较小,斜卵形或斜卵状披针形,顶端渐尖或尾状渐尖,边缘具疏离小锯齿,两面脉上被短柔毛,背面脉腋有须毛;小叶柄长3—12毫米。花序腋生,不分枝,通常与叶近等长,被短绒毛;花小,白色,萼片近圆形,直径1—1.5毫米;花瓣匙形,长约1毫米,鳞片2裂,被长柔毛;花盘被柔毛;花丝基部被毛。果近圆球形,直径约5—7毫米,红色。花期6—9月,果期12月。

产云南南部(勐腊),生海拔300—1200米的密林中。印度、中南半岛和马来群岛也有分布。

7. 毛叶异木患(植物分类学报) 图版2:1—8

Allophylus trichophyllus Merr. et Chun in Sunyatsenia **2**:270. Pl.57. 1935; How et Ho in Acta Phytotax. Sinica **3**:380. 1955, p.p. excl. specim. Yunnan.; 海南植物志 **3**: 78. 图577. 1974。