

我国仅云南西部(腾冲)和南部(蒙自)有记录¹⁾。缅甸的曼德勒为模式产地。

从文字记载看,本种和川滇无患子并无明显的不同,地理分布也是交叠的,很可能二者为同种或川滇无患子只是本种的变种或变型。

目前没有可靠的缅甸标本作比较,故暂不作定论。

4. 赤才属——*Erioglossum* Bl.²⁾

Bl. Bijdr. 5:229. 1825; Radlk. in Engler, Pflanzenr.

98(IV. 165): 692. 1932.

乔木或灌木。偶数羽状复叶,互生,无托叶。聚伞圆锥花序顶生或近枝顶腋生;花单性,雌雄同株,两侧对称;萼片5,覆瓦状排列,外面2片较小;花瓣4,有爪,鳞片大型,兜状,背面近顶部有一鸡冠状附属体;花盘肥厚,半月形;雄蕊(雄花)8,稍伸出,花丝带状,被长柔毛;子房(雌花)倒心形,3裂,3室,花柱线形,柱头浅3裂;胚珠每室1颗,着生在中轴的基部,上升。果深裂为3果片,通常仅1或2个发育,椭圆形,基部附着有微小的不育果片和残存花柱,外果皮肉质,内果皮脆壳质;种子无假种皮,种皮薄,种脐小,圆形;胚直,子叶肥厚,并生。

1或2种,分布在亚洲的热带和澳大利亚。

1. 赤才(海南) 孖仔树(广东徐闻),灵树 图版5

Erioglossum rubiginosum (Roxb.) Bl. Rumphia 3:118, in obs. 1847; Radlk. in Engler, Pflanzenr. 98(IV. 165):693. 1932; How et Ho in Acta Phytotax. Sinica 3:387. 1955; 海南植物志 3: 81, 图580. 1974.——*Sapindus rubiginosus* Roxb. Pl. Coromandel 1: 44, t. 62. 1795;——*Lepisanthes rubiginosa* (Roxb.) Leenh. in Blumea 17: 82. 1969.

常绿灌木或小乔木,高通常2—3米,有时达7米,树皮暗褐色,不规则纵裂;嫩枝、花序和叶轴均密被锈色绒毛。叶连柄长15—50厘米;小叶2—8对,革质,第一对(近基)卵形,明显较小,向上渐大,椭圆状卵形至长椭圆形,长3—20厘米,顶端钝或圆,很少短尖,全缘,腹面深绿色,稍有光泽,仅中脉和侧脉上有毛,背面干时常变褐色,被绒毛,毛通常很密,很少稀疏;侧脉约10对,末端不达叶缘;小叶柄粗短,长常不及5毫米。花序通常为复总状,只有一回分枝,分枝的上部密花,下部疏花;苞片钻形;花芳香,直径约5毫米;萼片近圆形,长2—2.5毫米;花瓣倒卵形,长约5毫米;花丝被长柔毛。果的发育果片长12—14毫米,宽5—7毫米,红色。 花期春季,果期夏季。

我国产于广东雷州半岛和海南岛以及广西的合浦和南宁地区,云南西双版纳有栽培。生灌丛中或疏林中,很常见。

1) 《植物分类学报》第三卷385页所载甘肃文县标本(王作宾1992, 2290)小叶无毛,定为川滇无患子较适当。

2) *Lepisanthes* Bl. emend. Leenh. subg. *Erioglossa* (Bl.) Leenh. (见Blumea 17:62, 81. 1969).