

根稍肥壮,民间作强壮剂入药;木材坚实,可作农具;果皮肉质,味甜可食。

5. 滇赤才属——*Aphania* Bl.¹⁾

Bl. Bijdr. 5: 236. 1825; Radlk. in Engler, Pflanzenr. 98(IV. 165): 699.

1932. — *Sapindopsis* How et Ho in Acta Phytotax. Sinica 3: 385. 1955.

灌木或乔木,很少攀援状。偶数羽状复叶,互生,无托叶;小叶通常1—2对,有时多达6对,对生或近互生。聚伞圆锥花序顶生或腋生;花单性,雌雄同株或异株,辐射对称;萼片5,覆瓦状排列,外面2片较小;花瓣5或有时4,与大的萼片近等长或稍长,常有爪,内面基部有2个耳状小鳞片;花盘碟状,5浅裂;雄蕊(雄花)7—8,很少5,内藏或稍伸出,花药卵形或箭头形;子房(雌花)倒心形或倒卵形,2裂,2室,很少3裂,3室;胚珠每室1颗,着生在中轴的中部。果深裂为2果片,通常仅1个发育,椭圆形、倒卵形或近球形,基部附着有细小的不育分果片和残存花柱,不脱落,外果皮肉质;种子无假种皮,种皮薄壳质,种脐小,圆形;胚直,子叶肥厚,并生,胚根极短,乳突状。

本属模式种: *A. montana* Bl.

约26种,分布在亚洲热带和大洋洲。我国有2种。

分 种 检 索 表

1. 花紫红色;核果的发育果片椭圆形,长约1.6厘米,宽约8毫米;小叶3—6对 1. 滇赤才 *A. rubra* (Roxb.) Radlk.
1. 花绿白色;核果的发育果片近球形或阔倒卵形,长1.2—1.4厘米,宽10—12毫米;小叶1或2对 2. 赛木患 *A. oligophylla* (Merr. et Chun) H. S. Lo

1. 滇赤才(植物分类学报)

Aphania rubra (Roxb.) Radlk. Sap. Holl Ind. 21, 69. 1878 et in Engler, Pflanzenr. 98(IV. 165): 714. 1932; How et Ho in Acta Phytotax. Sinica 3: 388. 1955. — *Scytalia rubra* Roxb. Fl. Ind. ed. 2, 2: 272. 1832. — *Sapindus ruber* (Roxb.) Kurz, For. Fl. Brit. Burma 1: 298. 1877. — *Lepisanthes senegalensis* (Poir.) Leenh. in Blumea 17: 85. 1969. p. min. p.; 云南植物志 1: 262. 图版 62(1-3).

常绿乔木或大灌木,高4—6米或更高;小枝圆柱状,无毛。叶连柄长可达60余厘米,叶轴粗壮,有直纹;小叶3—6对,近革质,卵形或卵状披针形,长15—40厘米,宽4—14厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部圆或有时近楔形,全缘,干时榄绿色,两面无毛;小叶柄粗厚,长约1厘米。花序腋生或近枝顶腋生,通常比叶短;花梗长1—2毫米;萼片小的阔卵形,

1) *Lepisanthes* Bl. emend. Leenh. subg. *Aphania* (Bl.) Leenh. (见 *Blumea* 17: 62, 83. 1969).