

7. 爪耳木属——*Otophora* Bl.¹⁾

Bl. *Rumphia* **3**: 142. 1847; Radlk. in Engler, *Pflanzenr.*

98 (IV. 165): 753. 1932.

灌木或小乔木。偶数或奇数羽状复叶，互生，无柄；小叶 2 至多对，第一对(近基)常小而无柄，着生在叶轴的基部宛如一对托叶。聚伞圆锥花序顶生或腋生；花单性，常雌雄同株，辐射对称；萼片 4 或 5，覆瓦状排列，外面 2 片较小，常膜质，内面 2 或 3 片稍厚，常花瓣状；花瓣 4 或 5，比萼片小，里面基部有 2 个耳状小鳞片；花盘碟状或环状，全缘或有圆齿；雄蕊(雄花)8 或有时 9，很少 5，花丝短，外弯，花药与花丝近等长，稍内弯，药隔阔大；子房(雌花)椭圆形，2 或 3 室，花柱常很短，柱头 2 或 3 裂；胚珠每室 1 颗，着生在中轴的近基部。果 2—3 室，或只有 1 室发育；种子无假种皮，种皮近革质；胚直，子叶肥厚。

本属模式种：*O. amoena* Bl.

约 30 种，分布在亚洲热带地区，以加里曼丹岛种类最多。我国仅下述 1 种。

1. 爪耳木(海南植物志) 图版 8

Otophora unilocularis (Leenh.) H. S. Lo, 海南植物志 **3**: 82, 575, 图 581. 1974. —
Lepisanthes unilocularis Leenh. in *Blumea* **17**: 73. t. 1. 1969.

灌木，高约 3 米；小枝圆柱状，径约 5 毫米，密被锈色绒毛。奇数羽状复叶长 22—30 厘米，叶轴密被短绒毛；小叶 12—14 对，坚纸质，第一对托叶状，小，卵形，长约 1.5 厘米，宽约 1 厘米，其余的披针形，长 5—7 厘米，宽 1—1.5 厘米，顶端渐尖，基部偏斜，上侧楔形，下侧钝圆，两面散生小腺点；中脉在腹面凸起，被糙伏毛，侧脉每边 8—10 条，距叶缘 2 毫米处网结；小叶柄极短，被绒毛。花未见。果序顶生，主轴下部有少数与中轴垂直的分枝，果椭圆形，长 10—12 毫米，宽 8—9 毫米，平滑，无毛；种子 1 颗，长约 8 毫米，褐色，种脐圆形。

我国特有，产广东海南岛崖县。生林中。

8. 龙眼属——*Dimocarpus* Lour.²⁾

Lour. *Fl. Cochinch.* 233. 1790; Leenh. in *Blumea* **19**: 114—116.

1971. — *Pseudonephelium* Radlk. *Sap. Holl. Ind.* 71. 1871.

乔木。偶数羽状复叶，互生；小叶对生或近对生，全缘。聚伞圆锥花序常阔大，顶生或近枝顶丛生，被星状毛或绒毛；苞片和小苞片均小而钻形；花单性，雌雄同株，辐射对称；萼杯状；深 5 裂，裂片覆瓦状排列，被星状毛或绒毛；花瓣 5 或 1—4，通常匙形或披针形，无

1) *Lepisanthes* Bl. emend. Leenh. subgen. *Otophora* (Bl.) Leenh. (见 *Blumea* **17**: 62, 70. 1969)

2) *Euphoria* auct. non Comm. ex Juss.: Gambl. (1791); Radlk. (1932.) (见 *Blumea* **19**: 114—116. 1971).



爪耳木 *Otophora unilocularis* (Leenh.) H. S. Lo: 1.果枝; 2.核果和宿存萼片。(自《海南植物志》)