

致死。

3. 灰岩肖韶子(云南植物志)

Dimocarpus fumatus (Bl.) Leenh. subsp. **callicola** C. Y. Wu 云南植物志 1: 269. 1977.

大乔木,高 20—35 米,胸高直径可达 80 厘米;小枝近圆柱形,淡褐红色,有皮孔。叶轴长 12—20 厘米左右,绿色,具不明显的条纹,小叶 3—5 对,近对生,革质,长圆形或长圆状披针形,长约 10—14 厘米,宽约 3.5—5 厘米,顶端近渐尖,钝头,基部阔楔形,全缘,干时稍反卷;侧脉较密,脉间距常不及 10 毫米,脉腋内有小腺孔,无毛或近无毛。花序未见,据《云南植物志》记载花无花瓣。果近球形,稍压扁,宽约 2 厘米余,覆有圆锥状短刺。

我国特有,产云南省西畴和麻栗坡一带。生长于海拔 1400 米左右石灰岩山上,见于阔叶林中。模式标本采自云南西畴。

据《云南植物志》本亚种和龙荔 *D. confinis* (即 *D. fumatus* subsp. *indochinensis*) 近似,在目前标本较少的情况下,编者仍保留它作为 *D. fumatus* (Bl) Leenh. 的亚种。

4. 滇龙眼(云南植物志)

Dimocarpus yunnanensis (W. T. Wang) C. Y. Wu et T. L. Ming, 云南植物志 1: 269. 1977. — *Xerospermum yunnanense* W. T. Wang, in Acta Phytotax. Sinica 6: 286. 1957.

常绿乔木,高约 10 米;小枝带红褐色,有直槽纹。叶连柄长 40 厘米或更长;小叶 4 对,互生,薄革质,长圆状披针形或披针形,长 23—44 厘米,宽 5—10 厘米,顶端短尖,基部楔形,稍不对称,全缘,两面无毛;侧脉 12—19 对,稍弯,斜上升,在背面凸起,网脉不明显;小叶柄长 5—8 毫米。花和花序均未见。核果近球形或扁球形,长约 1.8 厘米,宽达 2.1 厘米,果皮干时脆壳质,外面有疣状小突起,干时褐色;种子 1 颗,扁球形,假种皮与种皮分离。果期夏末秋初。

我国特有,产云南金平。生海拔 1000 米的林中,很少见。模式标本采自云南金平。

9. 荔枝属*——*Litchi* Sonn.

Sonn. Voy Ind. 2: 230. 1782; Radlk. in Engler, Pflanzenr.

98 (IV. 165): 914. 1932.

乔木。偶数羽状复叶,互生,无托叶。聚伞圆锥花序顶生,被金黄色短绒毛;苞片和小苞片均小;花单性,雌雄同株,辐射对称;萼杯状,4 或 5 浅裂,裂片镊合状排列,早期张开;无花瓣;花盘碟状,全缘;雄蕊(雄花)6—8,伸出,花丝线状,被柔毛;子房(雌花)有短柄,

* 据古籍记载“荔枝从艹从荔,不从荔。荔音离,割也。荔音协,同力也,荔字固当从荔。盖此木结实时,枝弱而蒂牢,不可摘取,必以刀斧割取其枝,故以为名。”唯“荔”字已通用,故本志仍用荔。