

zenr. **98** (IV. 165): 929. 1932; How et Ho in Acta Phytotax. Sinica **3**: 394. 1955; Li, Woody Fl. Taiwan 497. 1963 et Fl. Taiwan **3**: 588, 1977.——*P. pinnata* J. R. et G. Forst. f. *pinnata* Jacobs in Reinwardtia **6**: 120. 1962.

常绿大乔木,高 20 余米,最高达 50 米,树冠阔大,有发达的板根;小枝有直槽,有时被短硬毛。叶甚大,连柄长可至 1.5 米,叶轴和小叶近无毛至被绒毛;小叶密挤,5—9 对,有时达 15 对,近对生,第一对小,圆形、基部心形、托叶状,其余的长圆形或上部的近楔形,长 15—40 厘米,宽 5—10 厘米,顶端短尖或渐尖,边缘有整齐的锯齿;小叶柄短,肿胀。花序顶生或腋生,主轴和分枝均粗壮而坚挺,长 30—50 厘米,被微柔毛;花梗长 6 毫米,基部有关节;萼片长约 1 毫米,被微柔毛;花瓣倒卵状三角形,长、宽均约 2 毫米;雄蕊长 5 毫米。果椭圆形或有时近球形,长 3 厘米,宽 2 厘米,无毛,有光泽。

产我国台湾的台东和兰屿。菲律宾至萨摩亚群岛也有分布。

边材淡红,心材暗红褐色,质坚而重,是优良建筑用材。

2. 绒毛番龙眼(植物分类学报) 图版 11

Pometia tomentosa (Bl.) Teysm. et Binn. Cat. Hort. Bogor. 214. 1886; Radlk. in Engler, Pflanzenr. **98** (IV. 165): 934. 1932; How et Ho in Acta Phytotax. Sinica **3**: 393. 1955; 云南植物志 **1**: 271. 图版 64(1-3). 1977.——*Irina tomentosa* Bl. Bijdr. **5**: 230. 1825 et Rumphia **3**: 116. 1847.——*Pometia pinnata* J. R. et G. Forst. f. *tomentosa* (Bl.) Jacobs in Reinwardtia **6**: 130. 1962.

常绿大乔木,高 20—30 米或更高,板根发达,树皮鲜红褐色,内皮含红色树脂;小枝、花序、叶轴和小叶被绒毛。叶连柄长 30—100 厘米;小叶 4—13 对,近对生,第一对小,半月形或钻形,被绒毛,其余的大,长圆形,长 16—20 厘米或过之,宽 4.5—7.5 厘米,顶端短尖或渐尖,边缘有整齐的锯齿;小叶柄很短。花序腋生和顶生,有细长、末端俯垂的分枝,长达 40 厘米;苞片和小苞片均小;萼长 1—2 毫米,被茸毛;花瓣倒卵形至近圆形,与萼近等长或短很多;雄蕊长 6 毫米。果狭椭圆形,长 3 厘米,宽 1.6 厘米,无毛。花期早春,果期夏季。


产云南南部。为热带林上层主要树种之一。斯里兰卡、中南半岛、印度尼西亚的苏门答腊和爪哇等地也有分布。

树干高大,木材红色至红褐色,质坚实而重,纹理直,结构细而均匀;加工容易,抗腐抗虫,为滇南最重要的工业和建筑用材之一。

11. 干果木属——*Xerospermum* Bl.

Bl. Rumphia **3**: 99. 1847; Radlk. in Engler, Pflanzenr.

98 (IV. 165): 936. 1932.



绒毛番龙眼 *Pometia tomentosa* (Bl.) Teysm. et Binn. (邓盈丰绘)