

陷,在背面凸起且发亮;小叶柄长5—8毫米。花序多分枝,雄花序与叶近等长,雌花序较短;萼长1.5毫米,密被柔毛;花盘被柔毛;雄蕊7—8,花丝长3毫米,被长柔毛;子房2裂,2室,被柔毛。果椭圆形,红色,连刺长4—5厘米,宽3—4厘米;刺长1厘米或过之,两侧扁,基部阔,顶端尖,弯钩状。花期春季,果期夏季。

产云南南部、广西南部 and 广东西部,约以北回归线为其北限。生海拔500—1500米的密林中。菲律宾和越南也有分布。

本种果实的肉质假种皮味微酸,可食用,云南南部的乡镇集市偶有出售。无论从植物形态和产地判断,本种即古籍如《本草拾遗》等书所记载的韶子,但据现在所知未见入药。

本种在华南常为中等乔木,但在云南金平等地可见大乔木。木材材质中等,广西作三类材用。

### 3. 海南韶子(植物分类学报) 酸古蚁

**Nephelium topengii** (Merr.) H. S. Lo, 海南植物志 3:84, 574. 图583. 1974. ——*Xerospermum topengii* Merr. in Philip. Journ. Sci. 23: 250. 1923. ——*Nephelium lappaceum* Linn. var. *topengii* (Merr.) How et Ho in Acta Phytotax. Sinica 3: 394. 1955 (excl. specim. Yunnan.)

常绿乔木,高5—20米;小枝干时红褐色,常被微柔毛。小叶2—4对,薄革质,长圆形或长圆状披针形,长6—18厘米,宽2.5—7.5厘米,顶端短尖,基部稍钝至阔楔形,全缘,背面粉绿色,被柔毛;侧脉10—15对,直而近平行;小叶柄长5—8毫米。花序和花与上种相似。果椭圆形,红黄色,连刺长约3厘米,宽不超过2厘米,刺长3.5—5毫米。

我国特产,是海南岛低海拔至中海拔地区森林中常见树种之一。

果皮和树皮均含单宁。木材硬而重,但在薄壁组织中常有某种变色菌菌丝,故抗腐性不强,适作门、窗、家具、农具等用材。

## 13. 滨木患属——*Arytera* Bl.

Bl. Rumphia 3: 169. 1847; Radlk. in Engler, Pflanzenr.

98 (IV. 165): 1286. 1933.

乔木或灌木。偶状羽状复叶,互生,无托叶;小叶全缘。聚伞圆锥花序腋生;苞片和小苞片小;花单性,雌雄同株或异株,辐射对称;萼杯状,5裂,裂片镊合状排列;花瓣5,很少4,与萼近等长或稍短,有爪,内面基部有2个鳞片;花盘环状,完整或有时分裂;雄蕊(雄花)7—10,伸出,花丝线状,被毛;子房(雌花)倒卵形,2或3裂,2或3室,花柱顶端2或3裂;胚珠每室1颗。蒴果深裂为2或3果片,通常仅1或2个发育,发育果片成熟时室背开裂,果皮革质;种子有脆壳质的种皮,全部被假种皮包裹;胚弯拱,子叶叠生,上面一片较肥厚。