

很少为总状,单生叶腋或几个丛生于小枝的近顶部,与叶近等长或更长,主轴和分枝多少被毛;花梗长2—5毫米;萼裂片三角状卵形,长约1.5毫米,两面被柔毛;花瓣1—5或无花瓣,披针形或退化为鳞片状;花盘被短硬毛;花丝长短不齐,约2—3毫米,被柔毛。蒴果梨状或棒状,长1.2—2.5厘米,着生种子部份直径7—10毫米,通常1室,有种子1颗。花期春季,果期夏季。

产广东、广西、云南三省区南部,约以北回归线为北限。生密林中。广布亚洲热带地区。

本种木材具深红褐色的心材,边材宽而色较浅。结构细,略重,材质优良,可作工业用材。

3. 海南柄果木(植物分类学报)

Mischocarpus hainanensis H. S. Lo, 海南植物志 3: 87, 574. 图 585. 1974.

灌木,高通常2米左右,有时小乔木状;小枝粗壮,暗红色,近无毛,散生圆形皮孔。叶连柄长13—20厘米,叶轴圆柱状,上面微有棱角,与小枝近同色;小叶3或4对,极少2对,对生或近对生,革质,椭圆形或长圆状椭圆形,有时长圆状披针形,长17—25厘米,宽3—7.5厘米,顶端骤尖,钝头或微凹,两面无毛,干时网状小脉蜂巢状;侧脉12—14对,近边缘网结;小叶柄粗壮,长1—1.5厘米。花未见。果序几乎无总梗,近基部分枝,主轴和分枝均粗壮,被金黄色短柔毛;蒴果稀少,黄色,梨状,着生种子的部分宽1.4—1.5厘米,通常2室,每室有1颗半球形的种子。果期4—5月。

我国特有,产广东海南岛南部和东南部。常生林中。模式标本采自崖县。

15. 檀栗属——*Pavieasia* Pierre

Pierre, Fl. Forest. Cochinch. Fasc. 20, in textu ad t. 317. f. B. 1894;

Radlk. in Engler, Pflanzenr. 98 (IV. 165): 1315. 1933.

乔木。偶数羽状复叶,互生,无托叶,叶轴上面平坦,下面龙骨状凸起,横切面三角形;小叶常多对,全缘或有钝齿。聚伞圆锥花序近枝顶腋生,单生或几个丛生;苞片和小苞片均小;花单性,雌雄异株,辐射对称;萼浅杯状,深5裂,裂片卵形或三角形,覆瓦状排列;花瓣5,卵形或近卵形,内面基部有1个大型鳞片,鳞片厚,顶部反折,背面和边缘被硬毛;花盘深杯状,稍肉质,边缘薄,深波状;雄蕊(雄花)8,有时7,伸出,花丝线形,密被毛,花药短卵形或长圆状卵形,药隔凸出呈腺体状;子房(雌花)3室,花柱顶生,比子房长,柱头不明显3裂;胚珠每室1颗,弯生。蒴果,室背开裂为3果瓣,3室或其中的1或2室小而空虚(无种子);种子1—3颗,种皮革质,褐色,有光泽,种脐宽大,横椭圆形。

本属模式种: *P. anamensis* Pierre

3种,分布于越南北部和我国南部。我国2种。