

厘米,外面平坦,无瘤状凸起,室背开裂,果皮木质,厚约1毫米;种子近球状,斜压扁,宽约1.8厘米,种脐宽约9毫米。花期7月,果期9—10月。

我国特有,产广西南部 and 西南部。生林中。模式标本产地广西龙州。

2. 田林细子龙(植物分类学报) 墨仕

Amesiodendron tienlinense H. S. Lo in Acta Phytotax. Sinica 17: 36. 1979.

乔木,高10余米;小枝稍粗壮,有不甚明显的直纹,近无毛或被微柔毛。叶连柄长10—23厘米,叶轴柱状;小叶3—7对,对生或近对生,薄革质,长圆状披针形,长通常5—8厘米,很少达11厘米,宽1.5—2.5厘米,顶端渐尖,钝头,基部阔楔尖,通常中部以上有疏离小锯齿,干时褐色,两面无毛;侧脉15—16对,纤细,弯拱上行,网脉较清楚;小叶柄长3—4毫米,被短柔毛。花序腋生或在小枝的顶部丛生,与叶近等长或稍短,密被柔毛;花单性,具短梗;萼裂片近三角形,长约0.5毫米,两面被柔毛;花瓣通常5,有时6或7,近椭圆形,长约1.5毫米,鳞片大,顶部2裂,裂片反折,密被长毛;雄蕊8,花丝密被硬毛,长1.5—2毫米;子房密被毛。蒴果的发育果片近球状,直径1.3—1.5厘米,褐色。花期7月,果期11月。

我国特有,产贵州南部和广西西北部。生密林或疏林中。模式标本产地广西田林。

木材淡红,纹理直至斜,结构细,材质重,广西列为三类材,供造船、车辆和枪托等用。

3. 细子龙(海南) 莺哥木、坡露 图版17

Amesiodendron chinense (Merr.) Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 7: 207. 1937; How et Ho in Acta Phytotax. Sinica 3: 399. 1955 (excl. specim. Kweichow.); 海南植物志 3: 88,图586. 1974——*Paranephelium chinense* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 14: 30, f. 10. 1935.

乔木,高5—25米,树皮暗灰色,近平滑,内皮褐色;小枝粗壮,有浅沟纹,暗红褐色,被短柔毛。叶连柄长15—30厘米,叶轴被短柔毛或近无毛;小叶3—7对,通常4—6对,薄革质,第一对(近基)卵形,其余的长圆形或长圆状披针形,有时披针形,两侧稍不对称,长6—12厘米,宽1.5—3厘米或稍过之,顶端短渐尖或有时骤尖,钝头,基部阔楔形,边缘皱波状,有深割的锯齿,干时两面褐色,背面有时被微柔毛;侧脉纤细,10—12对;小叶柄长4—8毫米。花序常几个丛生于小枝的顶端,间有单个腋生,密被短绒毛;花单性,花梗长2—3毫米;萼裂片长约1毫米;花瓣白色,卵形,长约2毫米,鳞片全缘,顶端反折,背面和边缘密被皱曲长毛;雄蕊8或有时9,花丝长3—4毫米,密被长柔毛,花药被疏柔毛;子房和花柱被绒毛。蒴果的发育果片近球状,直径2—2.5厘米,黑色或茶褐色,外面有瘤状凸起和密集的淡褐色皮孔;种子宽约2厘米。花期5月,果期8—9月。

产广东海南各地、云南南部(?)。生海拔300—1000米处的密林中,为海南常见树种之一。据记载也产越南北部。模式标本来自海南崖县。