

排列,宿存或脱落;花瓣5,近楔形,无鳞片,稍肉质,比萼长,顶部反折,或近匙形,有短爪,内面有2个耳状小鳞片,质薄,比萼长2倍;花盘小;雄蕊(雄花)5,与花瓣近等长,在花芽中直立,或比花瓣长,在花芽中对折,花药长圆形;子房(雌花)球形或卵形,无柄或有短柄,两侧扁,通常2室,极少3或4室,花柱短或长而旋扭;胚珠每室1颗,悬垂,或2颗,叠生。蒴果通常两侧扁,通常2室(很少3或4室),室间有凹槽,果皮纸质或脆壳质;种子每室1或2颗,椭圆形或卵形,种皮薄壳质,有光泽,通常有白色或橙色的肉质假种皮;胚弯拱,子叶厚,叠生。

本属模式种: 假山萝 *H. cupanoides* Roxb.

约26余种,分布于亚洲热带和澳大利亚。我国1种。

1. 假山萝(海南) 哈甫木 图版24

Harpullia cupanoides Roxb. Fl. Ind. ed. 1, 2: 441. 1824; Radlk. in Engler, Pflanzenr. 98(IV. 165): 1444. 1933; How et Ho in Acta Phytotax. Sinica 3: 412. 1955; 云南植物志 1: 288, 图版67(10-13). 1977; Leenh. et M. Vente in op. cit. 26.

乔木,高可达20米,树皮黑色或暗灰色;小枝粗壮,仅嫩部被金黄色绒毛。叶连柄长15—50厘米,叶轴有直纹,近无毛;小叶3—6对,有时7对,薄革质,斜披针形,两侧不对称,长6—12厘米,宽2—4厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部楔形,腹面有光泽,两面无毛;侧脉约10对,较纤细;小叶柄长5—8毫米。花序疏散,柔弱,腋生或顶生,比叶短;苞片披针形,早落;花芳香,具长6—8毫米的花梗;萼片阔卵形,长约5毫米或稍过之,两面被短绒毛,宿存;花瓣楔形,稍肉质,长8—10毫米;花盘被绒毛;雄蕊5,比花瓣稍短;子房卵形,被绒毛。蒴果近球形或横椭圆形,两侧扁,高约2厘米,宽2—3厘米,成熟时无毛,褐色;种子卵形或椭圆形,长1.3—1.5厘米,黑褐色,假种皮包裹种子的全部。花期春夏间,果期秋末。

产云南南部、广东海南岛和雷州半岛。生林中、村边或路旁,海拔通常不超过700米。亚洲东南部至伊里安岛。模式产地孟加拉吉大港。

木材淡橙黄色,切面平滑而有光泽,纹理直,结构细,质坚而重;缺点是干后稍开裂且略有变形,易被变色菌侵染。适作梁、柱、门、窗、车辆、家具、农具等用材。

24. 茶条木属——*Delavaya* Franch.

Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 462. 1886; Radlk. in Engler,

Pflanzenr. 98(IV. 165): 1475. 1934.

灌木或小乔木。掌状复叶,互生,无托叶;小叶3片。聚伞圆锥花序顶生或腋生,单生或2—3个簇生;苞片和小苞片均小;花单性,雌雄异株;萼片5,覆瓦状排列,外面2片较小,宿存;花瓣5,比萼长,有爪,内面基部有一个2裂的鳞片;花盘下部短柱状,上部杯状,



假山萝 *Harpullia cupanoides* Roxb.: 1.果枝; 2.雌花; 3.花瓣;

4.雌花除去花被示雌蕊和不育雄蕊。(黄国材绘)