

2. 泡花树(江西)黑黑木(四川)、山漆槁(四川峨眉) 图版 36: 8—15

Meliosma cuneifolia Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris sér. 2, **8**: 211. 1886, et Pl. David. **2**: 29. 1888; Diels Engler, in Bot. Jahrb. **29**: 452. 1900; Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. **18**: 127. 1911; Hutch. in Bot. Mag. **137**. t. 8357. 1911; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. **2**: 199. 1914; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 644. 1933; Chun in Sunyatsenia **1**: 266. 1934; Cufod. in Oesterr. Bot. Zeit. **88**: 256. 1939; Rehd. Man. Cult. Trees et Shrubs 594. 1940; How in Acta Phytotax. Sinica **3**: 437. 1955; Steward, Man. Vasc. Pl. Low. Yangtze China 235. 1958. p. p.; 中国高等植物图鉴 **2**: 732. 图 3193. 1972. — *M. platypoda* Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. **2**: 201. 1914; Cufod. op. cit. 258. 1939; How op. cit. 436. 1955. — *M. dillenifolia* (Wall. ex Wight et Arn.) Walp. subsp. *cuneifolia* (Franch.) Beus. Blumea **19**: 442. fig. 21, 22, D1, 2. p. p. — *M. myriantha* auct. non Sieb. et Zucc.; Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**: 451. 1900. p. p.

落叶灌木或乔木,高可达9米,树皮黑褐色;小枝暗黑色,无毛。叶为单叶,纸质,倒卵状楔形或狭倒卵状楔形,长8—12厘米,宽2.5—4厘米,先端短渐尖,中部以下渐狭,约3/4以上具侧脉伸出的锐尖齿,叶面初被短粗毛,叶背被白色平伏毛;侧脉每边16—20条,劲直达齿尖,脉腋具明显髯毛;叶柄长1—2厘米。圆锥花序顶生,直立,长和宽15—20厘米,被短柔毛,具3(4)次分枝;花梗长1—2毫米;萼片5,宽卵形,长约1毫米,外面2片较狭小,具缘毛;外面3片花瓣近圆形,宽2.2—2.5毫米,有缘毛,内面2片花瓣长1—1.2毫米,2裂达中部,裂片狭卵形,锐尖,外边缘具缘毛;雄蕊长1.5—1.8毫米;花盘具5细尖齿;雌蕊长约1.2毫米,子房高约0.8毫米。核果扁球形,直径6—7毫米,核三角状卵形,顶基扁,腹部近三角形,具不规则的纵条凸起或近平滑,中肋在腹孔一边显著隆起延至另一边,腹孔稍下陷。花期6—7月,果期9—11月。


产甘肃东部、陕西南部、河南西部、湖北西部、四川、贵州、云南中部及北部、西藏南部。生于海拔650—3300米的落叶阔叶树种或针叶树种的疏林或密林中。模式标本采自四川宝兴。

木材红褐色,纹理略斜,结构细,质轻,为良材之一。叶可提单宁,树皮可剥取纤维。根皮药用,治无名肿毒、毒蛇咬伤、腹胀水肿。

2a. 光叶泡花树(植物分类学报)

Meliosma cuneifolia Franch. var. **glabriuscula** Cufod. in Oesterr. Bot. Zeit. **88**: 256. 1939; How in Acta Phytotax. Sinica **3**: 438. 1955. p. p. — *M. mairei* Cufod. op. cit. 257. 1939. How op. cit. 437. 1955. — *M. dillenifolia* (Wall. ex Wight et Arn.) Walp. subsp. *cuneifolia* (Franch.) Beus. var. *multinernia* Beus. in Blumea **19**: 443. 1971.

叶长10—24厘米,宽4—10厘米,基部下延至叶柄成狭翅;叶面近于无毛;侧脉每边20—30条;叶柄长2—15毫米,无毛或被稀疏细柔毛;圆锥花序较大,长16—30厘米等特



1--7. 重齿泡花树 *Meliosma dilleniifolia* (Wall. ex Wight et Arn.) Walp.: 1. 花枝; 2. 花萼;
3. 外花瓣; 4. 退化雄蕊; 5. 内花瓣及雄蕊; 6. 内花瓣; 7. 花盘和雌蕊。8—15. 泡花树 *Meliosma*
cuneifolia Franch.: 8. 花枝; 9. 花; 10. 外花瓣及退化雄蕊; 11. 内花瓣和雄蕊; 12. 内花瓣;
13. 花盘和雌蕊; 14. 果核背面; 15. 果核腹面。(冯钟元绘)