

端渐尖或骤狭渐尖,中部以下渐狭而下延,边缘具疏离、侧脉伸出成凸尖的粗锯齿,叶两面疏被短柔毛,中脉伸出成凸尖;侧脉每边 12—18 条,脉腋髯毛不明显;叶柄长 0.5—2 厘米,上面具宽沟,基部稍膨大包裹腋芽。圆锥花序顶生,向下弯垂,连柄长 12—18 厘米,宽 7—22(25) 厘米,主轴及侧枝在果序时呈之形曲折;花梗长 1—3 毫米;花白色,直径 3—4 毫米;萼片 5,卵形或广卵形,长 1—1.5 毫米,外 1 片特别小,具缘毛;外面 3 片花瓣近圆形,宽 2.5—3 厘米,内面 2 片花瓣长 0.5 毫米,2 裂,裂片广叉开,裂片顶端有缘毛,有时 3 裂则中裂齿微小;发育雄蕊长 1.5—2 毫米;雌蕊长约 1 毫米,子房无毛。果近卵形,长约 5 毫米,核板扁斜,具明显凸起细网纹,中肋锐凸起,从腹孔一边至另一边。花期 5—6 月,果期 7—9 月。

产陕西南部、四川东部、湖北西部、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、广东北部。生于海拔 600—2750 米的山地林间。模式标本采自湖北。

5. 多花泡花树(植物分类学报) 山东泡花树

Meliosma myriantha Sieb. et Zucc. in Abh. Bayer Akad. Wiss. Math. Phys. 4(2): 153. 1845; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 93. 1867; Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 145. 1886; Nakai, Fl. Korea 1: 138. 1909; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 254. 1912; 陈嵘, 中国树木分类学 731, 图 620. 1937; Cufod. in Oesterr. Bot. Zeit. 88: 259. 1939. Rehd. Man. Cult. Trees et Shrubs 594. 1940; How in Acta Phytotax. Sinica 3: 439. t. 58. fig. 1—5. p. p. 1955; 大井次三郎, 日本植物志 752. 1953; 中国高等植物图鉴 2: 731. 图 3192. 1972. — *M. myriantha* Sieb. et Zucc. subsp. *myriantha* Beus. in Blumea 19: 438. fig. 20, 22 B1, 2. 1971.

落叶乔木,高可达 20 米;树皮灰褐色,小块状脱落;幼枝及叶柄被褐色平伏柔毛。叶为单叶,膜质或薄纸质,倒卵状椭圆形、倒卵状长圆形或长圆形,长 8—30 厘米,宽 3.5—12 厘米,先端锐渐尖,基部圆钝,基部至顶端有侧脉伸出的刺状锯齿,嫩叶面被疏短毛,后脱落无毛,叶背被展开疏柔毛;侧脉每边 20—25(30) 条,直达齿端,脉腋有髯毛,叶柄长 1—2 厘米。圆锥花序顶生,直立,被展开柔毛,分枝细长,主轴具 3 棱,侧枝扁;花直径约 3 毫米,具短梗;萼片 5 或 4 片,卵形或宽卵形,长约 1 毫米,顶端圆,有缘毛;外面 3 片花瓣近圆形,宽约 1.5 毫米,内面 2 片花瓣披针形,约与外花瓣等长;发育雄蕊长 1—1.2 毫米;雌蕊长约 2 毫米,子房无毛,花柱长约 1 毫米。核果倒卵形或球形,直径 4—5 毫米,核中肋稍钝隆起,从腹孔一边不延至另一边,两侧具细网纹,腹部不凹入也不伸出。花期夏季,果期 5—9 月。

产山东、江苏北部。生于海拔 600 米以下湿润山地落叶阔叶林中。朝鲜、日本也有分布。

5a. 异色泡花树(植物分类学报)

Meliosma myriantha Sieb. et Zucc. var. **discolor** Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 358. 1908; How in Acta Phytotax. Sinica 3: 440. 1955. — *M. stewardii* Merr. in