

Fl. Siam. Enum. **1**: 341. 1926; Cufod. in Oesterr. Bot. Zeit. **88**: 261. 1939; Merr. in Brittonia **4**: 110. 1941; How in Acta Phytotax. Sinica **3**: 428. 1955; Gagnep. et Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. **1**: 41. 1960. in obs; Vidal in Fl. Thailand **23**: 35. 1963; Hara, Fl. E. Himal. 194. 1966. — *Millingtonia simplicifolia* Roxb. Pl. Coromandel **3**: 48. t. 254. 1819. — *Meliosma simplicifolia* (Roxb.) Walp. subsp. *simplicifolia* Beus. in Blumea **19**: 476. fig. 22, K. fig. 27. 1971. p. p.

乔木;小枝、叶柄、叶面中脉初被褐色细柔毛。叶为单叶,纸质,倒卵形或倒卵状长圆形,长15—40厘米,宽5—15厘米,先端急尖或短尾状尖,2/3以下渐狭成楔形,通常全缘。有时有小齿,叶面无毛,叶背脉腋有髯毛;侧脉每边15—20条,直至近叶缘弯拱环结,网脉纤细而明显;叶柄长1.5—2.5厘米,具宽沟。圆锥花序顶生,长10—40厘米,具3(4)分枝,中轴稍具3棱,花直径约2毫米,近于无梗;萼片5(4);卵状三角形,具柔毛和缘毛;外面3片花瓣近圆形,内面2片花瓣长约0.7毫米,稍短于雄蕊,分裂过半,稍叉开,裂片狭窄,顶端具短缘毛;子房无毛,花柱与子房等长或稍短。核果球形,直径3.5—6毫米,核近扁球形,通常歪斜,具稀疏凸起的粗网纹,腹部具3粗稜而形成三角形,中肋从腹孔一边显著隆起延至另一边,腹部稍凹入。花期1—2月,果期4—5月。

产西藏东南部至云南西南部。生于海拔1200—2000米的常绿阔叶林中。斯里兰卡、印度、孟加拉、尼泊尔、不丹、锡金、缅甸、泰国、老挝北部也有分布。

11. 疏枝泡花树(植物分类学报)

Meliosma longipes Merr. in Journ. Arn. Arb. **23**: 178. 1942; Gagnep. et Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. **1**: 27, t. 4. fig. 1, 2. 1960. — *M. depauperata* Chun ex How in Acta Phytotax. Sinica **3**: 427. t. 55. 1955; Gagnep. et Vidal op. cit. 30. 1960. — *M. lepidota* Bl. subsp. *longipes* (Merr.) Beus. in Blumea **19**: 456. fig. 22. I, fig. 24. 1971.

灌木或小乔木;小枝直径约5毫米,具散生椭圆点状皮孔。单叶,具长柄,通常集生于枝端,近革质,狭倒卵形,倒披针形,很少狭椭圆形,长15—25厘米,宽4—9厘米,先端骤狭尾状渐尖或渐尖,全缘,叶面干时浅暗褐色,中脉及侧脉凹入,叶背灰褐色,脉上疏生短柔毛;侧脉每边15—18条,稍弯拱向上环结,网脉稀疏;叶柄长3—5厘米,上面有浅沟。圆锥状果序近顶生或生于近顶端叶腋,长约30厘米,分枝稀疏,稍被微柔毛。核果近球形或倒卵形,直径8—10毫米,果柄粗壮,长2—3毫米,被微柔毛,核近球形,稍偏斜,具稍凸起的细网纹,中肋显著隆起,从腹孔一边延至另一边,有3—4条从腹孔射出的短纵稜,腹孔稍下陷或不下陷。花期夏季,果期8—9月。

产广东西南部、广西。生于中海拔至1200米的亚热带常绿阔叶林或阴湿丛林中。模式标本采自越南。

12. 樟叶泡花树(海南) 绿樟、秤先树、野木棉、饼汁树(广东) 图版40: 1—8