

米,宽 1.5—5 厘米,先端骤狭成条形尾状尖或很少渐尖,基部楔形,全缘,叶面无毛,干时中脉及侧脉在叶面凹下,叶背干时淡褐色;侧脉每边 7—10 条,与中脉成锐角稍弯拱至近叶缘环结;叶柄长 1.5—4 厘米,上面有狭沟。圆锥花序单独顶生或 2—4 个集生枝顶,有时近枝端腋生,直立,长 10—16 厘米,具 3 次分枝,基部分枝长 4—7 厘米;花直径约 2 毫米,具短梗;萼片卵形,长约 1 毫米,顶端圆,外面 2 片较狭小,有缘毛;外面 3 片花瓣近圆形,宽约 1.5 毫米,内面 2 片花瓣披针形,略长于发育雄蕊;子房近圆形,直径 0.5—0.7 毫米,无毛,花柱稍长于子房。核果倒卵形,直径 3—4 毫米,核具不明显的细网纹,中肋细,从腹孔一边延至另一边,腹部平。花期 3—4 月,果期 10—11 月。

产广东海南岛、云南西南部、西藏南部。生于海拔 1200—2400 米的常绿阔叶林中,以 1400—1900 米最为常见,在山谷密林及旷野丛林均能生长,以壤土生长良好。也分布于越南北部及泰国。模式标本采自云南。

14. 贵州泡花树(中国树木分类学) 图版 40: 9—17

Meliosma henryi Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**: 452. 1901; Hemsl. in Hook. Ic. Pl. **9**: t. 2832. 1907; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 644. 1933; 陈嵘, 中国树木分类学 732. 1937; Cufod. in Oesterr. Bot. Zeit. **88**: 262. 1939; How in Acta Phytotax. Sinica **3**: 430. t. 56. fig. 5—11 1955. —*M. henryi* Diels subsp. *henryi* Beus. in Blumea **19**: 450, fig. 22, F 1, 2. 1971.

小乔木高达 3 米,树皮黑褐色,厚长块状脱落;小枝纤细、无毛,具明显的白色皮孔。单叶,革质,披针形或狭椭圆形,长 7—12 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端渐尖,基部狭楔形,两面除中脉初被柔毛外,余无毛,叶面深绿色,有光泽,全缘;侧脉每边 5—9 条,纤细弯拱向上环结,网眼细密;叶柄长 1—2 厘米,具细柔毛。圆锥花序通常顶生,有时腋生,长 10—20 厘米,具 2(3) 次分枝,分枝劲直,被细柔毛。花直径约 2 毫米;花梗长 1—4 毫米,萼片椭圆状卵形,长约 1 毫米,顶端钝,具缘毛;外面 3 片花瓣扁圆形,宽约 2 毫米,内面 2 片花瓣卵状狭椭圆形,稍长于发育雄蕊;花盘浅,具 5 小齿,高约为子房 1/4;雌蕊长 1.2—2 毫米,子房无毛,稍短于花柱。核果倒卵形,直径 7—8 毫米;核近球形,顶基稍扁,直径 4—5 毫米,质薄,无网纹或网纹极不明显,中脉极不明显,腹孔细小,腹部不突出。花期夏季,果期 9—10 月。

产湖北西部、四川东部、贵州、云南中南部、广西北部及西南部。生于海拔 700—1400 米的常绿阔叶林中。模式标本采自湖北。

15. 紫珠叶泡花树(植物分类学报) 图版 41: 1—7

Meliosma callicarpaefolia Hayata, Ic. Pl. Formos. **3**: 68. 1913; **6**: 15. t. 2. 1916; Kaneh. Formos. Trees ed. 2. 414. fig. 370. 1936; How in Acta Phytotax. Sinica **3**: 430. 1955. 刘业经, 台湾树木志 **2**: 923. fig. 760. 1962; Li, Woody Fl. Taiwan 502. 1963, et Fl. Taiwan **3**: 594. 1977; 中国高等植物图鉴 **2**: 730. 图 3189. 1972. —



1—8. 樟叶泡花树 *Meliosma squamulata* Hance: 1. 果枝; 2. 花蕾; 3. 外花瓣及退化雄蕊;
4—5. 内花瓣及雄蕊; 6. 花盘和雌蕊; 7. 果核背面; 8. 果核腹面。9—17. 贵州泡花树 *Meliosma*
henryi Diels: 9. 果枝; 10. 花蕾; 11. 花; 12. 外花瓣及退化雄蕊; 13—14. 内花瓣及雄蕊;
15. 花盘和雌蕊; 16. 子房纵切面; 17. 果核。(冯钟元绘)