

叶柄长 1—2.5 厘米，被疏或较密的黄褐色柔毛。总花梗单生于上部叶腋，明显短于叶，长 2.5—3.5 厘米，被疏短柔毛，中部或中上部具苞片；苞片线形或线状披针形，被缘毛。花单生，较大，长 4—4.5 厘米，黄色，侧生萼片 2，卵形或长圆状卵形，长 10—12 毫米，宽 6 毫米，顶端短尖，具 5 脉，背面及边缘具多细胞长毛；旗瓣兜状，圆形，直径 12 毫米，顶端微凹，中肋背面具明显龙骨状突起，先端具小尖，被疏多细胞柔毛；翼瓣具短柄或近无柄，长达 22 毫米，宽 10—12 毫米，2 裂，基部裂片近圆形，上部裂片宽斧形，背部具半月形反折的小耳；唇瓣宽漏斗状，长 2 厘米，被疏短柔毛，口部斜上，宽 20 毫米，先端尖，基部渐狭成长 25 毫米内弯的距。花丝线形，长 5—6 毫米，上端扩大；花药卵圆形，顶端钝。子房纺锤状，长 4—5 毫米，具短喙尖。未成熟的蒴果线状圆柱形。花期 7—9 月。

产广西（大苗山、九万山、天峨）、贵州（榕江）。生于山谷河边或疏林中，或潮湿草丛中，海拔 500—700 米。

#### 140. 盈江凤仙花（新拟）

*Impatiens yingjiangensis* S. Akiyama et H. Ohba in Journ. Jap. Bot. **70** : 96. Fig. 1: 3a—3e, Fig. 2. 1995.

一年生草本，高 30—70 厘米。茎直立，通常不分枝或下部具短枝。叶互生，下部叶早落。叶片椭圆形或卵状椭圆形，长 7—13 厘米，宽 2.5—5 厘米，顶端尖或渐尖，基部楔状狭成长 1.5—3 厘米的叶柄，边缘具浅圆齿，齿端具小尖，基部边缘具 1—2 对具柄腺体，侧脉 6—7 对，上面深绿色，被极疏贴生短毛，下面灰绿色，无毛。总花梗生于上部叶腋，长 1.5—2 厘米，无毛，通常具 2 花；花梗长约 2 厘米，基部具苞片；苞片卵形，长 4—6 毫米，顶端尖，宿存。花粉红色，长约 3 厘米；侧生萼片 2，圆形，长 8 毫米，顶端尖；旗瓣粉红色，宽卵形，长 20 毫米，宽 22 毫米，顶端圆形，背面中肋具小鸡冠状突起，高约 3 毫米；翼瓣粉红色，具柄，长 38 毫米，2 裂，基部裂片宽长圆形，长 16 毫米，宽 10 毫米，顶端圆形，上部裂片卵状斧形，长约 25 毫米，宽 11 毫米，顶端圆钝，背部具肾形反折的小耳；唇瓣粉红色及淡黄色，檐部舟状，长约 22 毫米，口部平展，宽 18 毫米，先端稍钝，基部急收缩成长约 24 毫米内卷的距。花丝线形；花药顶端钝。子房纺锤状，无毛，蒴果线形或棒形（？）花期 5 月。

产云南西部（盈江、沧源）。生于山谷密林中或河边湿地，或岩石上，海拔 1000—1400 米。模式标本采自盈江铜壁关。

本种与蒙自凤仙花 *I. mengtzeana* Hook. f. 十分近似，但花粉红色而非黄色；旗瓣较长；翼瓣基部裂片宽长圆形，上部裂片卵状斧形；侧生萼片圆形与后者相区别。

#### 141. 秋海棠叶凤仙花（新拟）

*Impatiens begonifolia* S. Akiyama et H. Ohba in Journ. Jap. Bot. **70** : 90. fig. 1: 4q—4e et fig. 3. 1995.