

刻，背耳无或不明显；唇瓣斜漏斗形，长1厘米，基部渐尖为细长弯曲的距，口部平展，稍钝，宽达0.8(0.9)厘米。花药小而钝。花丝长而扁平。子房直立，细。蒴果纺锤形，种子少数，常4—5枚。种子长约3毫米，宽1.5毫米，狭卵形，有突起，黑色。

产四川(峨眉山)。生于林缘潮湿处，海拔2800—2900米。

本种与 *I. rostellata* Franch. 相似，但花较大，常3(—4)花，旗瓣相对小，基部裂片及花药均微小，可以区别。

147. 厚裂凤仙花(贵州植物志)

Impatiens crassiloba Hook. f. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris. Ser. 4, 10 : 258. 1908; 贵州植物志 7 : 630. 图 210: 1—6. 1989.

一年生肉质草本，高30—80厘米；茎直立，光滑具分枝，下部匍匐，节上长有不定根。单叶互生，卵形，长卵形或卵状披针形，长2—7厘米，宽1—3厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部楔形或宽楔形，边缘具粗锯齿，齿尖具小刚毛，基部边缘具数对腺体，侧脉每边6—8条；叶柄长0.5—2厘米。总花梗腋生，细弱，长1.5—2.5厘米，花梗短，长约1厘米，基部具1狭披针状小苞片，花小，黄色，长约2.5厘米；侧生萼片2，小，披针形，先端具突尖；旗瓣圆形，先端微有凹陷，有小尖头，基部倒心形，背面中肋具龙骨突；翼瓣3裂，上裂片大，先端偏后下陷，形成2个裂片，下裂片小，耳状；唇瓣舟状，基部下延成弯曲的长距；花药钝。花期9—10月，果期10—11月。

产贵州(毕节、贵阳、荔波、梵净山、天柱、平坝)。生于海拔620—1600米的水沟、小河、田边等水湿环境。模式标本采自贵州平坝。

148. 齿苞凤仙花(贵州植物志)

Impatiens martinii Hook. f. in Hook. Icon. Pl. t. 2870. 8; 1908; Lév. Fl. Kouy-Tcheou 179. 1915; 贵州植物志 7 : 636. 图 214: 9—14. 1989.

一年生肉质草本，高40—50厘米；茎纤细，直立，分枝，光滑无毛。单叶互生，卵形、长卵形或长椭圆形，长5—8厘米，宽2—4厘米，先端渐长或尾状渐尖，基部宽楔形，边缘粗锯齿，齿尖有小刚毛，侧脉每边6—10条，叶柄长0.5—1厘米。总花梗腋生，长4—5厘米，具花2朵；花梗短，0.5—1.5厘米，中上部具1狭卵形小苞片，苞片长约0.5厘米，边缘有锯齿；花小，白色或黄色，长约1.5厘米；侧生萼片2，卵形，中肋背面有龙骨突；长6—7厘米；旗瓣圆形，中肋背面有具喙的龙骨突；翼瓣3裂，上裂片大卵形，先端圆，基部分裂为小卵圆形裂片，下裂片小，圆耳状；唇瓣漏斗状，基部延伸为1内弯的长距，距长8—10毫米；花药钝。蒴果条形。花期7—9月，果期8—10月。

产贵州(平坝、江口、贵定、都匀和梵净山)。生于海拔700—2000米的阴湿处。模式标本采自贵州平坝。