

形，长2厘米，中部以下变狭，顶端急尖，略弯。种子少数，长圆形，长约4毫米，褐色。花期7—8月。

产云南（贡山、岳灵山）。生于山坡常绿阔叶林下阴湿处，海拔1400—1800米。模式标本采自云南岳灵山。

此种茎、枝及嫩叶密被黄褐色微绒毛，花橘黄色，侧生萼片和唇瓣被疏柔毛，总花梗密黄褐色微绒毛，容易识别。

181. **细柄凤仙花**（中国高等植物图鉴） 癆伤药（贵州），冷水七（湖北）冷水丹，红冷草（湖南） 图版54：9—17

Impatiens leptocaulon Hook. f. in Hooker's. Icon. Pl. tab. 2872. 1909; et in Fedde, lapert. sp. nov. 8 : 340. 1910; Lévl. Kouy-Tcheou 178. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7 : 653. 1933; 中国高等植物图鉴 2 : 747. 图 3224. 1972; Y. L. Chen in Acta Phytotax. Sin. 16 (2): 42. 1978. in clavi 贵州植物志 7 : 634. 1989.

一年生草本，高30—50厘米。茎纤弱，直立，不分枝或分枝，节和上部生褐色柔毛。叶互生，卵形或卵状披针形，长5—10厘米，宽2—3厘米，先端尖或渐尖，基部狭楔形，有几个腺体，边缘有小圆齿或小锯齿，无毛，叶脉5—8对；叶柄长0.5—1.5厘米。总花梗细，有1或2朵花；花梗短，中上部有披针形苞片；花红紫色；侧生萼片2片，半卵形，长突尖，不等侧，一边透明，有细齿；旗瓣圆形，中肋龙骨状，先端有小喙；翼瓣无柄，基部裂片小，圆形，上部裂片倒卵状矩圆形，背面有钝小耳；唇瓣舟形，下延长成内弯的长矩；花药钝。蒴果条形。


产湖北（兴山、合丰、宣恩、恩施、建始、神农架）、湖南（桑植）、贵州（贵定、清镇、桐梓、安龙、印江、江口、都匀、梵净山）、云南（镇雄）、四川（兴文、马边、越西、重庆（奉节、南川）。生于山坡草丛中、阴湿处或林下沟边，海拔1200—2000米。模式标本采自贵州清镇。

全草入药，治癆伤、妇女气血不和。

182. **睫毛萼凤仙花**（中国高等植物图鉴） 图版30：7—12

Impatiens blepharosepala Pritz. ex Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29 : 455. 1900; Hook. f. in Nouv. Arch. Mus. Paris, ser 4, 10 : 265. 1908; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7 : 653. 1933; 中国高等植物图鉴 2 : 745. fig. 3220. 1972; Y. L. Chen in Acta Phytotax. Sin. 16 (2): 43. 1978 in clavi; 安徽植物志 3 : 340. 1988; 福建植物志 3 : 336. 1989; 贵州植物志 7 : 628. 图 210: 7—12. 1989.

一年生草本，高30—60厘米。茎直立，不分枝或基部有分枝。叶互生，常密生于茎或分枝上部，矩圆形或矩圆状披针形，长7—12厘米，宽3—4厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部楔形，有2枚球状腺体，边缘有圆齿，齿端具小尖，侧脉7—9对。总花梗腋生，花1—2朵；花梗中上部有1条形苞片；花紫色；侧生萼片2，卵形，先端突



图版 54 1—8. 毛凤仙花 *Impatiens lasiophyton* Hook. f.: 1. 植株; 2. 叶; 3. 侧生萼片; 4. 旗瓣; 5. 翼瓣; 6. 唇瓣; 7. 花丝及花药; 8. 子房。9—17. 细梗凤仙花 *I. leptocaulon* Hook. f.: 9. 植株; 10. 苞片; 11. 侧生萼片; 12. 旗瓣; 13. 翼瓣; 14. 唇瓣; 15. 花丝及花药; 16, 17. 子房。(张泰利、张荣厚绘)