

密集于茎端；花蓝紫色；翼瓣上部裂片顶端无刚毛；唇瓣具顶端全缘内卷的距，与后者有别。

存 疑 种

除上述 220 种凤仙花属植物外，据文献记载，在云南尚有如下数种，或由于前人发表时原始描述过于简单，或未采到标本，一时难以确定它们的归属。现将它们的原始记载分别转译如下，提供进一步研究之参考。

1. 色果凤仙花（云南种子植物名录）

Impatiens dichrocarpa Lévl., Cat. Pl. Yunnan 120. 1916; Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edingb. 27 : 267. 1966; 云南种子植物名录上册：302. 1984.

一年生矮小草本，全株无毛。茎直立，有分枝，小枝常弯曲。叶互生，较小，下面变灰色，边缘有具芒尖的锯齿。总花梗具多数花，花黄色，极小，长 5 毫米，侧生萼片线形，蒴果长 2.1 毫米，黄色，明显具色。

产云南（东川）。生于溪边，海拔 2700 米。1912. 10. E. E. Maise s. n.

2. 岔河凤仙花（云南种子植物名录）

Impatiens mairei Lévl., Cat. Pl. Yunnan 122. 1916; Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edingb. 27 : 267. 1966; 云南种子植物名录上册：302. 1984.

一年生草本，被明显的毛。叶密集于茎上部，长 3—6 厘米，边缘具有芒尖的齿。花梗被腺体。花粉红色，侧生萼片褐色，边缘黄褐色；侧脉明显，乳白色。

产云南（东川）。生于海拔 2600—2700 米的悬崖崩塌物或牧场上。1912, 6—10. 本种除花外，全株被毛。与毛凤仙花 *I. lasiophyton* Hook. f. 近缘。

3. 巧家凤仙花（云南种子植物名录）

Impatiens vaniotiana Lévl., Cat. Pl. Yunnan 122. 1916; Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edingb. 27 : 261. 1966; 云南种子植物名录上册：305. 1984.

一年生草本，植株无毛。茎直立，有分枝。叶互生，长 8—10 厘米，宽 3—4 厘米，具柄，至少在顶端边缘具粗齿，齿端具芒尖，上部叶近无柄。花大，黄色，侧生萼片明显突尖。本种与岔河凤仙花 *I. mairei* Lévl. 近缘，但植株无毛和花黄色与后者相区别。

产云南（巧家，药山），生于海拔 3200 米的山地溪边。1912. 9. E. E. Maise s. n.

2. 水角属 *Hydrocera* Blume

Blume Bijdr. 241. 1825——*Tytonia* G. Don Gen. Syst. 1 : 749. 1831.