

in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 642. 1875.

小灌木；小枝对生或近对生，顶端刺状，灰褐色，无毛或被疏柔毛。叶狭小，硬纸质，互生，椭圆形、披针状椭圆形或卵状矩圆形，长1—2厘米，宽0.5—0.8厘米，顶端钝或锐尖，稀圆形，常有伸长的小尖头，基部钝圆，边缘具细锯齿，上面亮绿色，有光泽，无毛或被白色疏柔毛，下面被灰白色密绒毛，侧脉每边4—6条，上面不明显，下面中脉凸起；叶柄长1.5—2.5毫米，被白色密柔毛。花无梗，黄绿色，有白灰色柔毛，通常排成顶生和腋生穗状花序；花序轴长1—2厘米，密被灰白色柔毛；萼片三角形；花瓣匙形，白色，短于萼片。“果小，倒卵状球形，具3分核，成熟时黑色”（据文献）。花期9月。

此种据前人记载仅见于印度西北部、阿富汗及伊朗。在我国云南西北部（丽江、中甸）为分布新记录。生于中海拔的江边台地草丛中。模式标本采自阿富汗。

8. 皱叶雀梅藤（新拟） 锈毛雀梅藤（中国高等植物图鉴），九把伞（湖南）图版2:3—4
Sageretia rugosa Hance in Journ. Bot. 16: 9. 1878; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 2: 227. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 12. 1934; 中国高等植物图鉴 2: 750, 图 3230. 1972.——*S. ferruginea* Oliv. in Hook., Icon. Pl. 8: pl. 1710. 1887.——*Quercus dunniana* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 12: 363. 1913.


藤状或直立灌木，高达4米；幼枝和小枝被锈色绒毛或密短柔毛，侧枝有时缩短成钩状。叶纸质或厚纸质，互生或近对生，卵状矩圆形或卵形，稀倒卵状矩圆形，长3—8（11）厘米，宽2—5厘米，顶端锐尖或短渐尖，稀圆形，基部近圆形，稀近心形，边缘具细锯齿，幼叶上面常被白色绒毛，后渐脱落，下面被锈色或灰白色不脱落的绒毛，稀渐脱落，侧脉每边6—8条，有明显的网脉，侧脉和网脉上面明显下陷，干时常皱褶，下面凸起；叶柄长3—8毫米，上面具沟，被密短柔毛。花无梗，有芳香，具2个披针形小苞片，通常排成顶生或腋生穗状或穗状圆锥花序；花序轴被密短柔毛或绒毛；花萼外面被柔毛，萼片三角形，顶端尖，内面中肋顶端具小喙；花瓣匙形，顶端2浅裂，内卷，短于萼片；雄蕊与花瓣等长或稍长；子房藏于花盘内，2室，每室有1胚珠，花柱短，柱头头状，不分裂。核果圆球形，成熟时红色或紫红色，具2分核；种子2个，扁平，两端凹入，稍不对称。花期7—12月，果期翌年3—4月。

产广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、云南。生于海拔1600米以下的山地灌丛或林中，或在山坡、平地散生。模式标本采自广东北江。

本种与峨眉雀梅藤 *S. omeiensis* Schneid. 十分近似，且容易混淆。其不同在于后者叶较长，披针状或卵状椭圆形，顶端长渐尖或渐尖，叶柄较长，具不明显的皱褶和大型的圆锥状穗状花序，而本种叶通常较短，矩圆形，顶端锐尖或短渐尖，叶柄较短，上面有明显的皱褶。

9. 峨眉雀梅藤（拉汉种子植物名称）图版 2: 1—2

Sageretia omeiensis Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 2: 230. 1914.



1—2. 峨眉雀梅藤 *Sageretia omeiensis* Schneid.: 1. 花枝; 2. 叶背面。3—4. 皱叶雀梅藤 *Sageretia rugosa* Hance: 3. 花枝; 4. 叶脉。(冯晋庸绘)