

Sageretia thea (Osbeck) Johnston. var. **tomentosa** (Schneid.) Y. L. Chen et P. K. Chou in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 5: 75. 1979. — *S. theezans* (L.) Brongn. var. *tomentosa* Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 2: 228. 1914; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 674. 1933.

叶通常卵形、矩圆形或卵状椭圆形，下面被绒毛，后逐渐脱落，与上述变种相区别。

产甘肃、安徽、江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、云南、四川。朝鲜(济州岛)也有分布。模式标本采自朝鲜。

12. 钩刺雀梅藤 (新拟) 钩雀梅藤(广西植物名录), 猴栗(浙江) 图版 3: 1—2

Sageretia hamosa (Wall.) Brongn. in Ann. Sci. Nat. ser. 1, 10: 360. 1826; Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 641. 1875. — *Zizyphus hamosa* Wall. in Roxb. Fl. Ind. 2: 369. 1824. — *Rhamnus costata* Miq. Fl. Ind. Bot. 1: 645. 1855.

12a. 钩刺雀梅藤 (原变种)

Sageretia hamosa (Wall.) Brongn. var. **hamosa**

常绿藤状灌木; 小枝常具钩状下弯的粗刺, 灰褐色或暗褐色, 无毛或仅基部被短柔毛。叶革质, 互生或近对生, 矩圆形或长椭圆形, 稀卵状椭圆形, 长 9—15 (20) 厘米, 宽 4—6 (7) 厘米, 顶端尾状渐尖, 渐尖或短渐尖, 基部圆形或近圆形, 边缘具细锯齿, 上面有光泽, 无毛, 下面仅脉腋具髯毛, 或初时被疏柔毛, 后脱落, 侧脉每边 7—10 条, 上面下陷, 下面凸起; 叶柄长 8—15 (17) 毫米, 无毛。花无梗, 无毛, 通常 2—3 个簇生疏散排列成顶生或腋生穗状或穗状圆锥花序; 花序轴长可达 15 厘米, 被棕色或灰白色绒毛或密短柔毛; 苞片小, 卵形, 被疏短柔毛; 子房 2 室, 每室具 1 胚珠, 花柱短, 柱头头状。核果近球形, 近无梗, 长 7—10 毫米, 直径 5—7 毫米, 成熟时深红色或紫黑色, 有 2 分核, 常被白粉; 种子 2 个, 扁平, 棕色, 两端凹入, 不对称, 长约 6 毫米。花期 7—8 月, 果期 8—10 月。

产浙江、江西、福建、湖南、湖北、广东、广西、贵州、云南、四川及西藏东南部(察隅)。生于海拔 1600 米以下的山坡灌丛或林中。斯里兰卡、印度、尼泊尔、越南、菲律宾也有分布。模式标本采自尼泊尔。此种在湖南和西藏为首次记录。

本种外形酷似亮叶雀梅藤 *S. lucida* Merr., 因此前人曾将后者误认为本种, 但后者叶较小, 侧脉每边仅 5—6 条, 上面不下陷; 花序轴无毛, 与本种容易区别。

12b. 毛枝雀梅藤 (变种) (东北林学院植物研究室汇刊)

Sageretia hamosa (Wall.) Brongn. var. **trichoclada** C. Y. Wu ex Y. L. Chen in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 5: 75. 1979.

小枝、叶柄和花序轴均被黄褐色密柔毛; 花序为圆锥状穗状花序, 长达 23 厘米, 与原变种不同。核果当年成熟。

产云南南部(勐腊)。生于沟边密林中。

13. 密大雀梅藤 (台湾植物志)

Sageretia randaiensis Hayata in Ic. Pl. Formos. 5: 29. 1915; H. L. Li, Woody Fl. Taiw. 516. 1963, et Fl. Taiw. 3: 660. 1977. — *S. hamosa* auct. non (Wall.) Brongn.; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 131. 1886.

小灌木；小枝纤细，暗褐色，被黄褐色疏毛或近无毛，老枝常具与小枝对生的钩状下弯的刺。叶纸质，互生，矩圆形或卵状矩圆形，长8—13厘米，宽3.5—6厘米，顶端渐尖或长渐尖，基部圆形，边缘具细锯齿，上面暗绿色，无毛，下面浅绿色，仅脉腋具髯毛，或幼时沿脉被柔毛，后渐脱落，侧脉每边8—10条，中脉和侧脉在上面稍下陷，下面凸起；叶柄长5—13毫米，上面具沟，被疏短柔毛；托叶披针形，脱落。花无梗，无毛，单生或2—4个簇生排成顶生或腋生的穗状圆锥花序；花序轴长达10厘米，被浅褐色绒毛；苞片卵状三角形，被短柔毛或无毛；萼片三角形，长1.5毫米；花瓣小，匙形，长0.7毫米；雄蕊长于花瓣，花药卵状长圆形，顶端尖；子房2室，每室具1胚珠，花柱短，2裂。花期8—9月，果期10—11月。

产我国台湾中部和北部山区。模式标本采自我国台湾栳大山。

本种与钩刺雀梅藤 *S. hamosa* (Wall.) Brongn. 极其相似，有时不易区别。据李惠林(1963)认为后者乃是一个印度的种，而我国台湾的植物应隶属于此种。上述的描述是参照李惠林以及原始记载和仅有的一张无号标本编写而成。此种也可能是后一种分布于我国台湾的一个地理宗。

14. 刺藤子 (安徽) 图版 4: 4—5

Sageretia melliana Hand.-Mazz. in Pl. Melliana Sin. 2: 168. 1934.

常绿藤状灌木；具枝刺；小枝圆柱状，褐色，被黄色短柔毛。叶革质，通常近对生，卵状椭圆形或矩圆形，稀卵形，长5—10厘米，宽2—3.5厘米，顶端渐尖，稀锐尖，基部近圆形，稍不对称，边缘具细锯齿，上面绿色，有光泽，干时变栗褐色，两面无毛，侧脉每边5—7(8)条，上升，近边缘弧状弯，上面明显下陷，下面凸起；叶柄长4—8毫米，上面有深沟，被短柔毛或无毛。花无梗，白色，无毛，单生或数个簇生而排成顶生或稀腋生穗状或圆锥状穗状花序；花序轴被黄色或黄白色贴生密短柔毛或绒毛，长4—17厘米；苞片披针形或丝状，长2—4毫米；萼片三角形，顶端尖；花瓣狭倒卵形，短于萼片之半；花药顶端尖。核果浅红色。花期9—11月，果期翌年4—5月。

产安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、贵州、云南(西畴)。生于海拔1500米以下的山地林缘或林下。模式标本采自湖南桂阳。此种据前人记载，仅见于湖南，其余的省份均为分布新记录。

15. 尾叶雀梅藤 (新拟)

Sageretia subcaudata Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 2: 228. 1914; Hand.-Mazz. in Sitzgs. Akad. Wiss. Wien 58: 148. 1921, et Symb. Sin. 7: 673. 1933.

藤状或直立灌木，高达1.5米；小枝黑褐色，无毛或被疏短柔毛。叶纸质或薄革质，近