

对生或互生，卵形、卵状椭圆形、矩圆形或矩圆形，长4—10(13)厘米，宽2—4.5厘米，顶端尾状渐尖或长渐尖，稀锐尖，基部心形或近圆形，边缘具浅锯齿，上面绿色，无毛，下面初时被柔毛，后渐脱落，或仅沿脉被疏柔毛，侧脉每边(6) 7—10条，上面明显下陷，下面凸起，具明显的网脉；叶柄长5—11毫米，上面具沟，被密或疏柔毛；托叶丝状，长达6毫米。花无梗，黄白色或白色，通常单生或2—3个簇生排成顶生或腋生疏散穗状或穗状圆锥花序；花序轴长3—6厘米，被黄色绒毛；苞片三角状钻形，长约1毫米，无毛；花萼外面被疏短柔毛，萼片三角形，顶端尖；花瓣倒卵形，短于萼片，顶端微凹；雄蕊约与花瓣等长。核果球形，具2分核，成熟时黑色；种子宽倒卵形，黄色，扁平。花期7—11月，果期翌年4—5月。

产湖北、湖南、四川东部、陕西南部、河南西部、江西、贵州、云南、西藏(吉隆)、广东北部。生于海拔200—2000米的山谷山地林中或灌丛。模式标本采自湖北长阳。

本种与刺藤子 *S. melliana* Hand.-Mazz. 比较接近，但后者叶革质而无毛，顶端尖或渐尖，侧脉较少数，每边5—7条，网脉不明显，与此种不难区别。在河南、陕西、江西、广东、贵州、云南、西藏为分布新记录。

16. 梗花雀梅藤 (中国高等植物图鉴) 红雀梅藤(广西植物名录)，红藤(广西)，皱锦藤(四川)

Sageretia henryi Drumm. et Sprague in Kew Bull. Misc. Inform. 14. 1908; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 2: 623. 1916; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 13. 1934; Merr. et Chun in Sunyats. 5: 117. 1940. (excl. syn. *S. lucida* Merr.); 中国高等植物图鉴 2: 750, 图 3229. 1972. — *Berchemia cavaleriei* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 10: 433. 1912. — *S. cavaleriei* (Lévl.) Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 2: 228. 1914, et 263. 1915.

藤状灌木，稀小乔木，高达2.5米，无刺或具刺；小枝红褐色，无毛，老枝灰黑色。叶互生或近对生，纸质，矩圆形，长椭圆形或卵状椭圆形，长5—12厘米，宽2.5—5厘米，顶端尾状渐尖，稀锐尖或钝圆，基部圆形或宽楔形，边缘具细锯齿，两面无毛，上面干时栗色，稍下陷，下面凸起，侧脉每边5—6(7)条；叶柄长5—13毫米，无毛或被微柔毛；托叶钻形，长1—1.5毫米。花具1—3毫米长的梗，白色或黄白色，无毛，单生或数个簇生排成疏散的总状或稀圆锥花序，腋生或顶生；花序轴无毛，长3—17厘米；萼片卵状三角形，顶端尖；花瓣白色，匙形，顶端微凹，稍短于雄蕊；子房3室，每室具1胚珠。核果椭圆形或倒卵状球形，长5—6毫米，直径4—5毫米，成熟时紫红色，具2—3分核；果梗长1—4毫米；种子2，扁平，两端凹入。花期7—11月，果期翌年3—6月。

产湖南、湖北、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃和浙江南部。常生于山地灌丛或密林中，海拔400—2500米。模式标本采自云南蒙自。

果实可入药，有清火热和清胃热之功效。

本种以具明显的花梗(长1—3毫米)、排成总状或圆锥花序与本属的其它种有明显的

区别。前人 (Merrill et Chun 1940) 曾将无花梗和叶下面脉腋具髯毛的亮叶雀梅藤 *S. lucida* Merr. 合并入本种,这显然是错误的。后者应视为一个独立的种。本种在陕西、甘肃和浙江均为分布新记录。

2. 对刺藤属——*Scutia* Comm. ex Brongn.

Comm. ex Brongn. in Ann. Sci. Nat. ser. 1 10: 362. 1826.

藤状或直立灌木,具刺或无刺。叶对生或近对生,革质,具平行羽状脉,全缘或有不明显的锯齿。花数个簇生于叶腋,或排成具短总花梗的腋生聚伞花序,两性,5基数,具短花梗;花萼5裂,萼筒半球形或倒锥形;花瓣兜状或扁平,顶端微凹,基部具短爪;雄蕊与花瓣等长;花盘薄,贴生于萼筒内,边缘离生;子房球形,陷于花盘内,2—4室,每室具1胚珠,花柱短,不分裂或2—4裂。浆果状核果,倒卵球形或近圆球形,顶端常有残留的花柱,中部以下为宿存的萼筒所包围,萼筒与核果分离,2—4室,具2—4分核,每核有1种子;种子无沟,种皮薄至近革质。

属的模式种,印度对刺藤 *S. circumscissa* (L. f.) Radlk.

本属约9种,分布于亚洲南部、非洲东部和南美洲热带地区。我国1种,产云南、广西。

1. 对刺藤 (新拟) 双刺藤,钩刺藤 图版 5: 1—4

Scutia eberhardtii Tard. in Not. Syst. 12: 165. 1946.

常绿藤状或直立灌木,小枝互生,褐色或红褐色,具条纹,无毛,常有1个下弯的钩状皮刺,当年生枝被短柔毛。叶对生或近对生,革质,椭圆形,长3.5—6厘米,宽1.8—3厘米,顶端短渐尖或锐尖,基部宽楔形,边缘具极不明显的疏细锯齿,上面深绿色,有光泽,干后变栗色,下面浅绿色,两面无毛,侧脉每边5—8条,叶脉在上面明显凸起,下面平;叶柄长3—5毫米,无毛或有微毛;托叶披针形,长2—3毫米,脱落。花数个簇生于叶腋或排成具短总花梗的腋生聚伞花序,黄绿色,无毛;花芽卵状球形,顶端锐尖;花梗长1—2毫米;萼片5稀4个,长三角形,长约2毫米,顶端锐尖,内面中肋中部以上增厚,中央具小喙;花瓣5,稀4,兜状,长约1毫米,两侧内卷,顶端2—3浅裂,基部具短爪;雄蕊5,稀4个,为花瓣抱持,与花瓣等长;子房球形,基部贴生于萼筒底部,不藏于花盘内,2室,每室有1胚珠,花柱粗短,柱头不分裂。浆果状核果,倒卵状球形,长5毫米,直径4毫米,顶端常有残留的花柱,基部有宿存的萼筒,具2分核,各有1种子;果梗长3—4毫米,无毛;种子扁平,褐色,倒心形,无沟。花期3—5月,果期7—9月。

据文献载,此种原产越南。在我国云南(景洪、盈江)、广西(龙州)首次发现。生于低海拔林下,或在空旷处散生。模式标本采自越南。

3. 鼠李属——*Rhamnus* L.

L. Gen. Pl. ed. 1. 58. 1737, et Sp. Pl. ed. 1, 193. 1753; K.