

区别。前人 (Merrill et Chun 1940) 曾将无花梗和叶下面脉腋具髯毛的亮叶雀梅藤 *S. lucida* Merr. 合并入本种,这显然是错误的。后者应视为一个独立的种。本种在陕西、甘肃和浙江均为分布新记录。

2. 对刺藤属——*Scutia* Comm. ex Brongn.

Comm. ex Brongn. in Ann. Sci. Nat. ser. 1 10: 362. 1826.

藤状或直立灌木,具刺或无刺。叶对生或近对生,革质,具平行羽状脉,全缘或有不明显的锯齿。花数个簇生于叶腋,或排成具短总花梗的腋生聚伞花序,两性,5基数,具短花梗;花萼5裂,萼筒半球形或倒锥形;花瓣兜状或扁平,顶端微凹,基部具短爪;雄蕊与花瓣等长;花盘薄,贴生于萼筒内,边缘离生;子房球形,陷于花盘内,2—4室,每室具1胚珠,花柱短,不分裂或2—4裂。浆果状核果,倒卵球形或近圆球形,顶端常有残留的花柱,中部以下为宿存的萼筒所包围,萼筒与核果分离,2—4室,具2—4分核,每核有1种子;种子无沟,种皮薄至近革质。

属的模式种,印度对刺藤 *S. circumscissa* (L. f.) Radlk.

本属约9种,分布于亚洲南部、非洲东部和南美洲热带地区。我国1种,产云南、广西。

1. 对刺藤 (新拟) 双刺藤,钩刺藤 图版 5: 1—4


Scutia eberhardtii Tard. in Not. Syst. 12: 165. 1946.

常绿藤状或直立灌木,小枝互生,褐色或红褐色,具条纹,无毛,常有1个下弯的钩状皮刺,当年生枝被短柔毛。叶对生或近对生,革质,椭圆形,长3.5—6厘米,宽1.8—3厘米,顶端短渐尖或锐尖,基部宽楔形,边缘具极不明显的疏细锯齿,上面深绿色,有光泽,干后变栗色,下面浅绿色,两面无毛,侧脉每边5—8条,叶脉在上面明显凸起,下面平;叶柄长3—5毫米,无毛或有微毛;托叶披针形,长2—3毫米,脱落。花数个簇生于叶腋或排成具短总花梗的腋生聚伞花序,黄绿色,无毛;花芽卵状球形,顶端锐尖;花梗长1—2毫米;萼片5稀4个,长三角形,长约2毫米,顶端锐尖,内面中肋中部以上增厚,中央具小喙;花瓣5,稀4,兜状,长约1毫米,两侧内卷,顶端2—3浅裂,基部具短爪;雄蕊5,稀4个,为花瓣抱持,与花瓣等长;子房球形,基部贴生于萼筒底部,不藏于花盘内,2室,每室有1胚珠,花柱粗短,柱头不分裂。浆果状核果,倒卵状球形,长5毫米,直径4毫米,顶端常有残留的花柱,基部有宿存的萼筒,具2分核,各有1种子;果梗长3—4毫米,无毛;种子扁平,褐色,倒心形,无沟。花期3—5月,果期7—9月。

据文献载,此种原产越南。在我国云南(景洪、盈江)、广西(龙州)首次发现。生于低海拔林下,或在空旷处散生。模式标本采自越南。

3. 鼠李属——*Rhamnus* L.

L. Gen. Pl. ed. 1. 58. 1737, et Sp. Pl. ed. 1, 193. 1753: K.



1—4. 对刺藤 *Scutia eberhardtii* Tard.: 1. 果枝; 2. 花的解剖; 3. 果实; 4. 种子。 5—6. 茶叶雀梅藤 *Sageretia camellifolia* Y. L. Chen et P. K. Chou: 5. 果枝; 6. 种子。(王金凤绘)