

1—3 厘米腋生聚伞总状花序,常有钻状小苞片;花序轴、花梗和花均被短柔毛;花 5 基数,萼片三角形,顶端尖,花瓣小,早落;花梗长 1—2 毫米;雄花有退化雌蕊,雌花有极小的退化雄蕊,子房球形,3 室,每室有 1 胚珠,花柱 3 浅裂或半裂。核果倒卵状球形,直径 4—5 毫米,基部有宿存的萼筒,具 3 分核,紫红色,成熟时变黑色;种子 2—3 个,倒卵状矩圆形,背面有约与种子等长上窄下宽的纵沟。花期 5—7 月,果期 8—11 月。

产湖北西部(咸丰、利川)、四川(西部、西南至东南部)、贵州(北部、西南部)、广西(隆林、凌乐、乐业、罗城)、云南东南部(砚山)。生于山谷密林、林缘或灌丛中,海拔 400—1800 米。模式标本采自贵州平伐(贵定南)。

此种的小枝具不明显瘤状皮孔;叶纸质,长椭圆形或倒披针形,渐尖至长渐尖,边缘具细锯齿,下面或沿脉被短柔毛;种子背面有约与种子等长的纵沟,与广西鼠李 *R. kwangsiensis* Y. L. Chen et P. K. Chou 相区别。

16b. 木子花(变种)(峨眉山)

Rhamnus esquirolii Lévl. var. *glabrata* Y. L. Chen et P. K. Chou, in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 5: 78. 1979. — *R. esquirolii* auct. non Lévl.; 周太炎,植物分类学报 1: 378. 1951.

小枝、叶柄、花序轴、花萼和花梗均与原变种相一致,不同在于叶下面无毛或仅腋脉被簇毛。

产四川峨眉山、贵州(安龙、兴义、兴仁、毕节、清镇)。生于海拔 500—1800 米的山地林缘、林下或灌丛中。模式标本采自四川峨眉山。

此植物在峨眉山俗称木子花。民间用叶和果实捣烂,敷治刀伤。

17. 黑背鼠李(新拟)

Rhamnus nigricans Hand.-Mazz. in Sitzgsanz. Ak. W. W. 62: 234, Taf. 9, Abb. 5. 1925, et Symb. Sin. 7: 675. 1933; Grub. in Act. Inst. Bot. Sci. Acad. URSS ser. 1, 8: 301. 1949.

灌木或小乔木,高达 5 米,枝无刺;幼枝被柔毛,小枝纤细,具多数瘤状皮孔。叶纸质或厚纸质,大小异形,交替互生,下部叶较小,椭圆形、矩圆形或宽椭圆形,长 7—16 厘米,宽 3.5—7 厘米,顶端短渐尖或短尾状尖,基部圆形,边缘稍背卷,具黄软骨质细锯齿,干时变黑色,上面多少有光泽,具细颗粒,无毛或近无毛,下面或至少沿脉被短柔毛,侧脉每边 6—7 条,极斜,近边缘弧状弯曲,横脉多少疏网状,上面下陷,下面凸起;叶柄长 1.2—2 厘米,被毛或仅上面有疏毛;托叶早落。花较多数,通常排成腋生聚伞短总状花序或具分枝的聚伞圆锥花序,被短柔毛,有极小的三角形苞片;花梗较粗,长约 1.5 毫米,无毛;花单性,雌雄异株,5 基数;花萼片三角形,外面被微柔毛;花瓣短于萼片之半,长圆形;雌花花柱 3 半裂。核果倒卵状球形或球形,基部有宿存的萼筒,具 3 或 2 分核,成熟时紫黑色;种子背面有长为种子 3/4 上窄下宽的纵沟。花期 5—7 月,果期 7 月以后。