

实的标本 (Meyer 249) 发表了 *R. meyeri* Schneid., 认为该种“小枝被细柔毛, 近对生, 叶对生, 卵形, 卵圆形或圆形, 上面被疏微柔毛, 下面沿脉有疏柔毛和髯毛, 叶柄有疏毛”与本种极为相似, “仅以种子背面具较宽的沟有别”。从该种的原始记载看来, 似乎与本种没有明显的差别。但未见模式标本, 有待今后进一步证实。

28. 桃叶鼠李 (新拟) 冻绿树 (四川城口)

Rhamnus iteinophylla Schneid. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berl. 5: 76. 1908. et Ill. Handb. Laubholz. 2: 281, f. 198 i—k, 196 n—o, 1909, et in Sarg. Pl. Wils. 2: 239. 1914; Grub. in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS ser. 1, 8: 325. 1949.

灌木, 高 1.5 米; 幼枝无毛或近无毛, 小枝对生或近对生, 稀互生, 灰褐色或紫黑色, 枝端有时具针刺, 短枝上的顶芽小, 有数个鳞片, 腋芽不明显。叶纸质, 对生或近对生, 或稀互生, 在短枝上丛生, 狭椭圆形或倒披针状椭圆形, 长 4—10 厘米, 宽 1—2.2 厘米, 顶端尾状长渐尖或渐尖, 具长可达 2 厘米的直或弯尖头, 基部楔形, 边缘有钝或圆齿状锯齿, 上面深绿色, 初时沿脉被短柔毛, 后渐脱落, 下面淡绿色, 仅脉腋有簇毛; 侧脉每边 5—7 条, 上面明显下陷, 下面凸起; 叶柄长 2—6 毫米, 有微柔毛; 托叶披针形, 长于叶柄, 具疏缘毛, 宿存。花单性, 雌雄异株, 4 基数, 有花瓣; 花梗长约 5 毫米; 雄花数个至 10 余个簇生于短枝端, 有退化雌蕊; 雌花通常 1 至数个簇生于短枝顶端叶腋, 退化雄蕊极小, 子房 3 室, 每室有 1 胚珠, 花柱 3 浅裂或近半裂。核果倒卵状球形, 直径 3.5—4 毫米, 紫黑色, 顶端常有残存的花柱, 基部有宿存的萼筒, 具 2—3 个分核; 果梗长 5—7 毫米, 无毛; 种子背面有长为种子 $2/3$ 的纵沟。

产湖北西部 (恩施、兴山)、四川东部 (城口、万源) 及云南 (广南)。生于山坡、沟边林中或灌丛中, 海拔 1000—2000 米。模式标本采自湖北兴山。

此种叶似桃叶, 尾状长渐尖, 侧脉在上面明显下陷, 叶柄短, 核果较小极易识别。

29. 薄叶鼠李 (中国高等植物图鉴) 郊李子 (四川), 白色木、白赤木 (河南), 蜡子树 (湖北兴山), 细叶鼠李 (广西植物名录)

Rhamnus leptophylla Schneid. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berl. 5: 77. 1908, et Ill. Handb. Laubholz. 2: 285, f. 196 v—w, 198 e—h. 1909, et in Sarg. Pl. Wils. 2: 239, 250. 1914; 陈嵘, 中国树木分类学 740. 1937; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 676. 1933; Grub. in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS ser. 1, 8: 330. 1949; 中国高等植物图鉴 2: 761, 图 3251. 1972. — *R. inconspicua* Grub. in Not. Syst. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 12: 129. 1950. syn. nov.

灌木或稀小乔木, 高达 5 米; 小枝对生或近对生, 褐色或黄褐色, 稀紫红色, 平滑无毛, 有光泽; 芽小, 鳞片数个, 无毛。叶纸质, 对生或近对生, 或在短枝上簇生, 倒卵形至倒卵状椭圆形, 稀椭圆形或矩圆形, 长 3—8 厘米, 宽 2—5 厘米, 顶端短突尖或锐尖, 稀近圆形, 基