

部楔形,边缘具圆齿或钝锯齿,上面深绿色,无毛或沿中脉被疏毛,下面浅绿色,仅脉腋有簇毛,侧脉每边3—5条,具不明显的网脉,上面下陷,下面凸起;叶柄长0.8—2厘米,上面有小沟,无毛或被疏短毛;托叶线形,早落。花单性,雌雄异株,4基数,有花瓣;花梗长4—5毫米,无毛;雄花10—20个簇生于短枝端;雌花数个至10余个簇生于短枝端或长枝下部叶腋,退化雄蕊极小,花柱2半裂。核果球形,直径4—6毫米,长5—6毫米,基部有宿存的萼筒,有2—3个分核,成熟时黑色;果梗长6—7毫米;种子宽倒卵圆形,背面具长为种子 $2/3$ — $3/4$ 的纵沟。花期3—5月,果期5—10月。

广布于陕西、河南、山东、安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川、云南、贵州等省区。生于山坡、山谷、路旁灌丛中或林缘,海拔1700—2600米。模式标本采自湖北。

全草药用,有清热、解毒、活血之功效。在广西用根、果及叶利水行气、消积通便、清热止咳。

此种外形与圆叶鼠李 *R. globosa* Bunge 比较相似,但该种幼枝、叶两面、花及花梗被短柔毛;而本种幼枝无毛,叶仅下面脉腋有簇毛,容易区别。两种的种子背面的沟也不同。

Grubow 曾根据湖北、浙江及湖南的标本发表了另一个种 *R. inconspicua* Grub., 认为“该种叶质较硬,侧脉较多,叶上面和叶柄被密毛等特征与本种不同”。但我们检查了该种的同原模式标本(浙江雁荡山,焦起源1345号),发现此植物除叶下面沿脉被疏毛外,其余的特征均与本种无明显的区别。因此,在此予以归并。

30. 刺鼠李 (拉汉种子植物名称) 叫李子(四川) 图版 17: 1—4

Rhamnus dumetorum Schneid, in Sarg. Pl. Wils. 2: 237. 1914.

30a. 刺鼠李(原变种)

Rhamnus dumetorum Schneid. var. *dumetorum*

灌木,高3—5米;小枝浅灰色或灰褐色,树皮粗糙,无光泽,对生或近对生,枝端和分叉处有细针刺,当年生枝有细柔毛或近无毛。叶纸质,对生或近对生,或在短枝上簇生,椭圆形,稀倒卵状、倒披针状椭圆形或矩圆形,长2.5—9厘米,宽1—3.5厘米,顶端锐尖或渐尖,稀近圆形,基部楔形,边缘具不明显的波状齿或细圆齿,上面绿色,被疏短柔毛,下面稍淡,沿脉有疏短毛,或腋脉有簇毛,稀无毛,侧脉每边4—5条,稀6条,上面稍下陷,下面凸起,脉腋常有浅窝孔;叶柄长2—7毫米,有短微毛;托叶披针形,短于叶柄或几与叶柄等长。花单性,雌雄异株,4基数,有花瓣;花梗长2—4毫米;雄花数个;雌花数个至10余个簇生于短枝顶端,被微毛,花柱2浅裂或半裂。核果球形,直径约5毫米,基部有宿存的萼筒,具2或1分核;果梗长3—6毫米,有疏短毛;种子黑色或紫黑色,背面基部有短沟,上部有沟缝。花期4—5月,果期6—10月。

产四川、云南西北部、贵州、西藏(波密、错那)、甘肃东南部(武都、文县、天水)、陕西南



1—4. 刺鼠李 *Rhamnus dumetorum* Schneid.: 1. 果枝; 2. 叶上面; 3. 叶背面; 4. 种子。5—6. 带枝鼠李 *Rhamnus virgata* Roxb.: 5. 果枝; 6. 种子。(王金凤绘)