

褐色,长约3毫米,有光泽,背面有与种子近等长的浅宽沟,上端常有叉状附属物。

产新疆西南部(塔什库尔干)。生于亚高山山坡石缝中,海拔3000—4000米。苏联中亚地区也有分布。模式标本采自帕米尔。

此种叶极小,倒卵形或倒卵状椭圆形,种子背面有与种子近等长的浅宽沟,与平卧鼠李 *R. prostrata* Jacq. 可以区别。

45. 平卧鼠李 (新拟) 旱鼠李 图版 21: 3—5

*Rhamnus prostrata* Jacq. in Journ. 2: 346. 1841, in obs. nomen; Parker in Kew Bull. 217. 1921; Grub. in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS ser. 1, 8: 348. 1949.——*R. persicus* auct. non Boiss.; Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 638. 1875. p. p.

矮小平卧灌木,高1—2米;枝互生,幼枝平展,红褐色,被微柔毛或无毛,花枝常扭曲,多节,皮灰褐色或红褐色,稍有鳞状裂,枝端具针刺。叶纸质,互生,或在短枝上簇生,椭圆形或卵状椭圆形,稀矩圆形,长7—22毫米,宽4—10毫米,顶端钝或圆形,有时微凹,基部宽楔形,边缘有不明显的疏细齿或近全缘,侧脉每边2—4条,下面多少明显,常在近边缘处联接,上面绿色,下面黄绿色,干时变黄色,两面被微毛或近无毛;叶柄长1—3毫米,有微毛;托叶钻状披针形,红褐色,被微毛,宿存,短于叶柄或与叶柄几等长。花单性,雌雄异株,黄绿色,通常3—4个簇生于短枝顶端,具短花梗,被微毛;萼杯状,萼片卵状三角形;花瓣极小,狭线形;花盘无毛;花柱3—4浅裂。核果倒卵状球形,直径约5毫米,紫红色,成熟时变黑色,具3—4分核,基部有环状的宿存萼筒;果梗长3—4毫米,近无毛;种子卵状矩圆形,黄褐色,长约3毫米,具疣状突起,背面有具软骨状边缘的浅宽沟,沟长为种子的4/5,上端具短叉状附属物。花期5—6月,果期6—8月。

产西藏西部(普兰、札达、吉隆)。生于亚高山或高山冲积扇多石山坡,海拔2800—3900米。印度东北部、克什米尔地区、巴基斯坦及阿富汗也有分布。模式标本采自喜马拉雅西北部。

此种外形酷似矮小鼠李 *R. minuta* Grub., 但后者植株矮小(高不超过25厘米);叶倒卵形或倒卵状椭圆形,长不超过10毫米,与本种可以区别。

46. 台中鼠李 (新拟) 中原氏鼠李(台湾植物志) 图版 16: 1—2

*Rhamnus nakaharai* (Hayata) Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 61. 1911, et Ic. Pl. Formos. 1: 143. 1911; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 425. f. 381. 1936; Grub. in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS ser. 1, 8: 324. 1949; H. L. Li, Woody Fl. Taiw. 515. 1963, et Fl. Taiw. 3: 657. 1977.——*R. arguta* Maxim. var. *nakaharai* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 25 (19): 70. 1908.

灌木,全株无毛;小枝开展,互生,皮暗褐色,粗糙,无光泽,枝端常有顶芽,不变为针



1—2.蔓生鼠李 *Rhamnus procumbens* Edgew.: 1. 花果枝; 2. 雌花。3—5.平卧鼠李 *Rhamnus prostrata* Jack.: 3. 果枝; 4. 果实; 5. 种子。(张泰利绘)