

厘米,宽 1.5—3 厘米,顶端渐尖,基部圆形或宽楔形,边缘具不明显的疏细锯齿,下面沿脉被柔毛,侧脉 3—5 对,两面稍凸起,网脉不明显;叶柄长 0.8—1.5 厘米,被密柔毛。腋生聚伞花序,花两性,五基数,总花梗长 1—3 毫米,花梗长 2—3 毫米;萼片三角形,内面中肋中部以上凸起;花瓣倒卵圆形,与雄蕊等长;花盘肥厚,圆形;子房藏于花盘内,3 室,每室 1 胚珠,花柱 3 半裂。蒴果状核果圆球形,直径 8 毫米,成熟时室背开裂,具 3 分核,每核 1 种子。萼筒与核果愈合,包围果实近中部;果梗长 8—12 毫米。花期 7—8 月,果期 8—10 月。

据前人记载,本种仅见于印度、越南、老挝、柬埔寨。在我国云南南部(开远、元江)首次发现。

本种幼枝、叶下面沿脉、叶柄和花序被柔毛,果梗长(8—12 毫米)与蛇藤 *C. asiatica* (L.) Brongn. 相区别。

6. 麦珠子属——*Alphitonia* Reiss. ex Endl.

Reiss. ex Endl. Gen. Pl. 1908. 1840.

乔木或灌木。叶互生,全缘,羽状脉;托叶小,早落。聚伞花序组成顶生或腋生的聚伞总状或聚伞圆锥花序,花两性或杂性;花萼 5 裂;花瓣 5,匙形,两侧内卷,基部具爪;雄蕊 5 枚,为花瓣抱持;花盘厚,填塞于萼筒内,圆形,有 5 个凹缺,或五边形;子房藏于花盘内,2—3 室,每室 1 胚珠,花柱短,2—3 裂。蒴果状核果,球形,中部以下为合生的萼筒所包围,外果皮初时肉质,成熟时不规则开裂,有 2—3 个木质或硬骨质的分核,每核具 1 种子,分核沿腹缝线开裂;种子有膜质的假种皮,但顶端开口。

属的模式种:高麦珠子 *A. excelsa* Reiss. ex Endl.

约 15 种,分布于菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、波利尼西亚群岛及太平洋南部一些岛屿。我国 1 种,产广东海南岛。

1. 麦珠子(中国高等植物图鉴) 山木棉,蒙蒙木,山油麻,白石松,银树

Alphitonia philippinensis Braid in Kew Bull. 183. 1925; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 6: 282. 1929; 中国高等植物图鉴 2: 752, 图 3233. 1972; 海南植物志 3: 7, 图 581. 1974.

常绿乔木,高达 18 米;幼枝被锈色绒毛,小枝被细短柔毛。叶互生,厚纸质,卵状长椭圆形或卵状矩圆形,长 7—13 厘米,宽 2.5—5 厘米,顶端短渐尖或渐尖,稀锐尖,具小尖头,基部圆形或截形,全缘或波状,上面绿色,幼叶上面被锈色绒毛,后脱落,下面被灰白色棉毛,侧脉每边 11—15 条,上面下陷,下面凸起,具明显网脉;叶柄长 0.9—1.5 厘米,被密短柔毛。聚伞花序组成腋生聚伞总状或聚伞圆锥花序,被锈色密绒毛,长 2—5 厘米,具长 3—5 毫米的总梗,花两性,5 基数,花梗长 1—2 毫米;花萼 5 裂,萼片三角形,内面中部以上具凸起的中肋;花瓣匙形,具爪,与雄蕊等长;花盘厚,五边形;子房藏于花盘内,2—3 室,每室 1 胚珠,花柱 2—3 半裂。蒴果状核果,球形,直径 1—1.2 (1.4) 厘米,成熟时黑色,中

部以下为萼筒所包围,外果皮不规则开裂,内有2—3个木质化的分核,成熟时沿腹缝线开裂,每核具1种子;果梗长3—4毫米;种子红色,有光泽,具膜质假种皮,顶端开口。花期10—12月,果期翌年3—5月。

产广东(海南岛)。生中海拔的丘陵或山地疏林中,或成大片纯林,喜光。菲律宾、马来西亚和印度尼西亚也有分布。模式标本采自菲律宾。

幼树生长迅速,是优良的速生造林树种;木材结构细致,是制作家具的良好用材。

2. 枣族——Trib. ZIZIPHEAE Brongn.

Brongn. Enum. Gen. 122. 1843; Hook. f. in Benth. et Hook. f.

Gen. Pl. 1: 372. 1862.

子房上位,稀近半下位。果为核果;核通常具硬壁,1至3室;种皮膜质或纸质。常为具刺灌木。

本族我国产6属。

7. 猫乳属*——*Rhamnella* Miq.

Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 30. 1867.——*Microhamnus* auct. non A. Gray.; Maxim. in Mém. Acad. sci. st. Petersb. ser. 7, 10: 4. 1866.

落叶灌木或小乔木。叶互生,具短柄,纸质或近膜质,边缘具细锯齿,羽状脉;托叶三角形或披针状条形,常宿存与茎离生。腋生聚伞花序,具短总花梗,或数花簇生于叶腋;花小,黄绿色,两性,5基数,具梗;萼片三角形,无网状脉,中肋内面凸起,中下部有喙状突起;花瓣倒卵状匙形或圆状匙形,两侧内卷;雄蕊背着药,花丝基部与爪部离生,披针状条形;子房上位,仅基部着生于花盘,1室或不完全2室,有2胚珠,花柱顶端2浅裂。花盘薄,杯状,五边形。核果圆柱状椭圆形,桔红色或红色,成熟后变黑色或紫黑色,顶端有残留的花柱,基部为宿存的萼筒所包围,1—2室,具1或2种子。

属的模式种:猫乳 *R. franguloides* (Maxim.) Weberb.

本属共7种,分布于中国、朝鲜和日本。我国均产。

分 种 检 索 表

1. 幼枝,叶下面和叶柄被柔毛。
 2. 叶倒卵状矩圆形或倒卵状椭圆形,稀倒卵形,顶端尾状渐尖或长渐尖,下面或沿脉被柔毛,侧脉每边8—13条……………1. 猫乳 *R. franguloides* (Maxim.) Weberb.
 2. 叶近椭圆形或矩圆形,顶端短渐尖或渐尖,下面被绒毛或柔毛,侧脉每边5—8条……………

* 中名异名: 长叶绿棠属(中国树木分类学);假鼠李属(中国种子植物科属辞典)。