

23. 叶较大, 长 3.5—14 厘米, 宽 2—6.5 厘米, 边缘有 5—15 个锯齿, 下面密被锈色柔毛; 果实较大, 直径 0.8—1.5 厘米, 种子腹面洼穴不明显

..... 12. 毛枝蛇葡萄 *A. rubifolia* (Wall.) Planch.

23. 叶较小, 长 3—6 厘米, 宽 0.5—3 厘米, 边缘全缘或有 1 至数个不明显锯齿, 下面仅中脉上被稀疏柔毛; 果实较小, 直径 0.5—0.7 厘米, 种子腹面洼穴明显, 上宽下狭

..... 15. 贡山蛇葡萄 *A. gongshanensis* C. L. Li

1. 蓝果蛇葡萄 (植物分类学报) 闪光蛇葡萄 (经济植物手册), 蛇葡萄 (秦岭植物志)

Ampelopsis bodinieri (Lévl. & Vant.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **15**: 23. 1934 et Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs 616. 1940; Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh. **37** (3): 282. 1967; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **17** (3): 89. 1979 in clavi; 胡先骕, 经济植物手册下册 960. 1957; 秦岭植物志 **1** (3): 268. 图 231. 1981; 云南种子植物名录上册 790. 1984; 河南植物志 **2**: 601. 1988. — *Vitis bodinieri* Lévl. & Vant. in Bull. Soc. Agr. Sarthe. **40**: 36. 1905 et in Repert. Sp. Nov. Reg. Veg. **2**: 157. 1906. — *A. micans* Rehd. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **21**: 188. 1912. — *Vitis micans* (Rehd.) Bean. Trees & Shrubs Brit. Isl. **3**: 501. 1933. — *A. heterophylla* (Thunb.) Sieb. & Zucc. var. *amurensis* auct. non Planch. (1887); Gagnep. in Sarg. Pl. Wils. **1**: 100. 1911. — *V. heterophylla* auct. non Thunb. (1784); Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 27. 1914 p. p.

1a. 蓝果蛇葡萄 (原变种)

A. bodinieri (Lévl. & Vant.) Rehd. var. *bodinieri*

木质藤本。小枝圆柱形, 有纵棱纹, 无毛。卷须 2 叉分枝, 相隔 2 节间断与叶对生。叶片卵圆形或卵椭圆形, 不分裂或上部微 3 浅裂, 长 7—12.5 厘米, 宽 5—12 厘米, 顶端急尖或渐尖, 基部心形或微心形, 边缘每侧有 9—19 个急尖锯齿, 上面绿色, 下面浅绿色, 两面均无毛; 基出脉 5, 中脉有侧脉 4—6 对, 网脉两面均不明显突出; 叶柄长 2—6 厘米, 无毛。花序为复二歧聚伞花序, 疏散, 花序梗长 2.5—6 厘米, 无毛; 花梗长 2.5—3 毫米, 无毛; 花蕾椭圆形, 高 2.5—3 毫米; 萼浅碟形, 萼齿不明显, 边缘呈波状, 外面无毛; 花瓣 5, 长椭圆形, 高 2—2.5 毫米; 雄蕊 5, 花丝丝状, 花药黄色, 椭圆形; 花盘明显, 5 浅裂; 子房圆锥形, 花柱明显, 基部略粗, 柱头不明显扩大。果实近球形, 直径 0.6—0.8 厘米, 有种子 3—4 颗; 种子倒卵椭圆形, 顶端圆钝, 基部有短喙, 急尖, 表面光滑, 背腹微侧扁, 种脐在种子背面下部向上呈带状渐狭, 腹部中棱脊突出, 两侧洼穴呈沟状, 上部略宽, 向上达种子中部以上。花期 4—6 月, 果期 7—8 月。

产陕西、河南、湖北、湖南、福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南。生山谷林中或山坡灌丛荫处, 海拔 200—3 000 米。模式标本采自贵州贵阳。