

等植物图鉴补编 2: 353. 图 8851. 1972 et Guihaia. 8 (2): 113. 1988; 福建植物志 3: 379. 1988. —— *A. glandulosa* (Wall.) Momiyama var. *kulingensis* (Rehd.) Momiyama in Journ. Jap. Bot. 52 (1): 31. 1977.

本变种与原变种区别在于, 叶片显著呈五角形, 上部侧角明显外倾, 植株被短柔毛或几无毛。花期 5—7 月, 果期 8—9 月。

产安徽、江苏、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州。生沟谷林下或山坡灌丛, 海拔 300—1 600 米。模式标本采自江西庐山。

3. 尖齿蛇葡萄 (植物分类学报)

Ampelopsis acutidentata W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 78 et 89. 1979 in clavi; 云南种子植物名录上册 790. 1984; 西藏植物志 3: 227. 图 94: 3—5. 1986. —— *A. humulifolia* auct. non Bge. (1835); 云南种子植物名录上册 791. 1984.

木质藤本。小枝圆柱形, 有棱纹, 无毛。卷须 2 叉分枝, 相隔 2 节间断与叶对生。叶卵圆形, 长 2.5—7.5 厘米, 宽 3—7 厘米, 顶端急尖或渐尖, 基部截形或近截形, 边缘有多数不整齐锐锯齿, 齿常较深, 上面绿色, 下面浅绿色, 两面均无毛; 基出脉 5, 中央脉有侧脉 3—4 对, 网脉不明显突出; 叶柄长 1.5—4 厘米, 无毛; 托叶早落。花序为伞房状多歧聚伞花序, 假顶生或与叶对生; 花序梗长 1.3—3 厘米, 无毛; 花梗长 2—3 毫米, 无毛; 花蕾卵圆形, 高 1.5—2 毫米, 顶端圆形; 萼碟形, 边缘波状浅裂, 无毛; 花瓣 5, 卵椭圆形, 高 1.3—1.8 毫米, 无毛; 雄蕊 5, 花药卵圆形, 长宽近相等; 花盘发达, 波状浅裂; 子房下部与花盘合生, 花柱钻形, 柱头不明显扩大。果实近球形, 直径 0.7—0.8 厘米, 有种子 1 颗; 种子倒卵圆形, 顶端圆形, 基部有短喙, 种脐在背面中部呈带状椭圆形, 表面无肋纹, 上部种脊突出, 腹部中棱脊突出, 两侧洼穴呈倒卵椭圆形, 从基部向上达种子近中部。花期 6—8 月, 果期 9—10 月。

产四川、云南、西藏。生岩边流石坡或山坡灌丛, 海拔 2 000—3 200 米。模式标本采自云南德钦。

本种与蓝果蛇葡萄 *A. bodinieri* (Lévl. & Vant.) Rehd. 接近, 但本种叶缘有不整齐深锯齿, 叶基部截形或近截形, 显然不同。

4. 毛叶蛇葡萄 (植物研究)

Ampelopsis mollifolia W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 6 (4): 21. 图版 1: 2—4. 1986.

木质藤本。小枝圆柱形, 有纵棱纹, 密被灰白色长柔毛。叶卵圆形, 长 4—6.5 厘米, 宽 3—6 厘米, 顶端急尖, 基部阔楔形或近截形, 边缘每侧有 12—16 个圆齿, 或微 3—5 裂, 上面绿色, 密被灰色卷曲柔毛, 下面浅绿色, 密被灰色长柔毛; 基出脉 3, 中央脉有侧脉 3—4 对, 网脉上面不明显, 下面突出; 叶柄长 1—2.5 厘米, 密被灰白色长柔毛; 托叶膜质, 褐色, 卵圆形, 长约 2 毫米, 宽 1—2.5 毫米, 顶端急尖, 被灰白色短柔毛。花

序为多歧或复二歧聚伞花序，与叶对生；花序梗长 1—2.5 厘米，密被灰白色长柔毛；花梗长 2—2.5 毫米，无毛；花蕾卵圆形，高 1.8—2.5 毫米，顶端圆形；萼碟形，边缘呈波状浅裂，无毛；花瓣 5，卵形，高 1.6—2.3 毫米，无毛；雄蕊 5，花药卵圆形，长宽近相等；花盘发达，5 浅裂；子房下部与花盘合生，花柱钻形，柱头顶端微扩大。花期 7 月。

产四川。生河边灌丛，海拔约 1 300 米。模式标本采自四川盐源。

本种与绒毛蛇葡萄 *A. tomentosa* Planch. 相近，但本种植株密被灰白色长柔毛，叶片卵圆形，叶缘有不整齐圆齿或微 3—5 裂，可以区别。

5. 绒毛蛇葡萄 (植物分类学报)

Ampelopsis tomentosa Planch. in DC. Monogr. Phan. **5**: 457. 1887; Franch. Pl. Delav. 139. 1890; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 682. 1933; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **17** (3): 89. 1979 in clavi; 云南种子植物名录上册 792. 1984.

5a. 绒毛蛇葡萄 (原变种)

A. tomentosa Planch. var. *tomentosa*

木质藤本。小枝圆柱形，有纵棱纹，被灰色或灰褐色糙毛。叶为单叶，长 2—5.5 厘米，宽 2—5 厘米，顶端常 3 浅裂，基部近截形或阔楔形，边缘每侧有 8—10 个圆钝锯齿，上面绿色，伏生糙毛，下面灰绿色，密被灰色糙毛，基出脉 3，中央脉有侧脉 3—4 对，网脉不明显突出；叶柄极短，长约 2 毫米，密被糙毛；托叶褐色，膜质，早落。复聚伞花序与叶对生或顶生，花序梗长 2—5 厘米，密被灰色糙毛；花梗长 1—1.2 毫米，无毛；花蕾卵圆形，高 1.3—1.6 毫米，顶端圆形；萼浅碟形，无毛；花瓣 5，花丝扁平，花药黄色，卵圆形；花盘发达，边缘 5 浅裂；花柱短，柱头不明显扩大。浆果球形，有种子 2—3 颗；种子呈倒三角状卵圆形，基部有短喙，表面有钝棱突起，腹部两侧洼穴短，种脊在背面显著。花期 7 月，果期 9 月。

本种 Planchon (1887) 在发表时描述：“除花和花梗外全株被灰色或红灰色绒毛”，经作者核对存于巴黎自然历史博物馆模式标本，并非绒毛而是糙毛，特此更正。

产云南。生草地或林中。模式标本采自云南宾川与绍庆交界处大坪子。

5b. 脱绒蛇葡萄 (变种)

A. tomentosa Planch. var. *glabrescens* C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. **2** (1): 48. 1996.

本变种与原变种区别，在于植株完全无毛。果期 6 月。

产云南。海拔约 1 710 米。模式标本采自云南宾川。

6. 葎叶蛇葡萄 葎叶白藜 (北京)，小接骨丹 (陕南) 图版 6: 2

Ampelopsis humulifolia Bge. in Mém. Div. Sav. Acad. Sci. St. Pétersb. **2**: 86. 1835; Rehd. in Nitt. Deutsch. Dendr. Ges. **21**: 187. 1912 et Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs. 616. 1940; Chien in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China. **3**: 63. 1927; 东北