

产湖北、四川。生山坡林缘或灌丛，海拔 700—2 700 米。模式标本采自四川南川。

9. 乌头叶蛇葡萄 (中国树木分类学) 马葡萄 (河南)，草白藟，乌头叶白藟，附子蛇葡萄 (经济植物手册)，过山龙 (柞水)

Ampelopsis aconitifolia Bge. in Mém. Div. Sav. Acad. Sci. St. Pétersb. **2**: 86. 1835; Planch. in DC. Monogr. Phan. **5**: 450. 1887; Diels & Gilg in Engler's Bot. Jahrb. **29**: 465. 1900; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **2**: 321. f. 213. g—g'. 1909; Gagnep. in Sarg. Pl. Wils. **1**: 100. 1911; 陈嵘，中国树木分类学 759. 1937; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **18**: 220. 1937 et Rehd Man. Cult. Trees & Shrubs. 617. 1940; 东北木本植物图志 415. 1955; 胡先骕，经济植物手册下册 961. 1957; Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. **37** (3): 281. 1967; 中国高等植物图鉴 **2**: 780. 图 3289. 1972; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **17** (3): 90. 1979 in clavi; 内蒙古植物志 **4**: 79. 图版 **37**: 1—3. 1979; 秦岭植物志 **1**(3): 270. 1981; 江苏植物志下册 473. 图 1513. 1982; 北京植物志上册 563. 图 713. 1984. — *Vitis dissecta* Carr. in Rev. Hort. **1868**: 10. f. 1. 1868. — *V. aconitifolia* (Bge.) Hance in Journ. Linn. Soc. Bot. **13**: 77. 1873. — *A. aconitifolia* Bge. var. *dissecta* Koehne, Deutsch. Dendr. 400. 1893. — *A. aconitifolia* Bge. var. *cuneata* Diels & Gilg in Engler's Bot. Jahrb. **29**: 465. 1900. — *V. heterophylla* Thunb. var. *aconitifolia* Lévl. & Vant. in Bull. Soc. Agr. Sci. Art. Sarthe. **40**: 39. 1905, nom. nud.

9a. 乌头叶蛇葡萄 (原变种)

A. aconitifolia Bge. var. **aconitifolia**

木质藤本。小枝圆柱形，有纵棱纹，被疏柔毛。卷须 2—3 叉分枝，相隔 2 节间断与叶对生。叶为掌状 5 小叶，小叶 3—5 羽裂，披针形或菱状披针形，长 4—9 厘米，宽 1.5—6 厘米，顶端渐尖，基部楔形，中央小叶深裂，或有时外侧小叶浅裂或不裂，上面绿色无毛或疏生短柔毛，下面浅绿色，无毛或脉上被疏柔毛；小叶有侧脉 3—6 对，网脉不明显；叶柄长 1.5—2.5 厘米，无毛或被疏柔毛，小叶几无柄；托叶膜质，褐色，卵披针形，长约 2.3 毫米，宽 1—2 毫米，顶端钝，无毛或被疏柔毛。花序为疏散的伞房状复二歧聚伞花序，通常与叶对生或假顶生；花序梗长 1.5—4 厘米，无毛或被疏柔毛；花梗长 1.5—2.5 毫米，几无毛；花蕾卵圆形，高 2—3 毫米，顶端圆形；萼碟形，波状浅裂或几全缘，无毛；花瓣 5，卵圆形，高 1.7—2.7 毫米，无毛；雄蕊 5，花药卵圆形，长宽近相等；花盘发达，边缘呈波状；子房下部与花盘合生，花柱钻形，柱头扩大不明显。果实近球形，直径 0.6—0.8 厘米，有种子 2—3 颗；种子倒卵圆形，顶端圆形，基部有短喙，种脐在种子背面中部近圆形，种脊向上渐狭呈带状，腹部中棱脊微突出，两侧洼穴呈沟状，从基部向上斜展达种子上部 1/3。花期 5—6 月，果期 8—9 月。

产内蒙古、河北、甘肃、陕西、山西、河南。生沟边或山坡灌丛或草地，海拔 600—