

1.5 毫米, 顶端圆形; 萼碟形, 边缘全缘, 无毛; 花瓣 4, 椭圆形, 高 0.7—1.2 毫米, 无毛; 雄蕊 4, 花药卵圆形, 长宽近相等; 花盘明显, 波状 4 浅裂; 子房下部与花盘合生, 花柱钻形, 柱头微扩大。果实近球形, 直径约 1 厘米, 有种子 1 颗; 种子椭圆形, 顶端圆形, 基部有短喙, 种脐在种子背面基部与种脊无异, 种脊突出, 腹面中棱脊突出, 腹侧基部两侧凹陷为种子之洼穴。 花期 6—8 月, 果期 9—10 月。

产福建、台湾、广东、广西、海南、云南。生田边、草坡、灌丛和林中, 海拔 100—200 米。印度、越南、泰国、印度尼西亚和澳大利亚也有分布。

6. 掌叶白粉藤 (植物分类学报)

Cissus triloba (Lour.) Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. Philadelphia **24**: 254. 1935; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **17** (3): 88. 1979 in clavi; 云南种子植物名录上册 796. 1984. ——*Callicarpa triloba* Lour. Fl. Cochinch. 70. 1790. ——*Cissus modeccoides* Planch. in DC. Monogr. Phan. **5**: 503. 1887; Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. **1**: 356. 1911 et in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine. **1**: 971. 1912 et in Humbert, Suppl. Fl. Gen. Indo-Chine. **1**: 1950; Craib, Fl. Siam. Enum. **1**: 307. 1926. Merr. in Lingn. Sci. Journ. **5**: 121. 1927.

草质藤本。小枝圆柱形, 有纵棱纹, 无毛, 常被白粉, 节部干时易脆断。卷须不分枝, 相隔 2 节间断与叶对生。叶异形, 不裂叶叶片卵圆形, 长 7—7.5 厘米, 宽 5—5.5 厘米, 顶端急尖或渐尖, 基部心形, 基缺张开呈钝角, 边缘每侧有 20—30 个尖锐锯齿, 分裂叶者为 3—5 深裂, 阔卵形, 基部深心形, 基缺狭窄或两侧部分重叠, 裂片披针形, 顶端渐尖, 两面绿色, 无毛; 基出脉 3—5, 中脉有侧脉 5—7 对, 网脉微突出; 叶柄长 2.5—8 厘米, 无毛; 托叶椭圆形, 长 4—6 毫米, 宽 3—4 毫米, 无毛。花序顶生或与叶对生, 复二歧聚伞花序; 花序梗长 3—5.5 厘米, 无毛; 花梗长 2—6 毫米, 无毛; 花蕾椭圆形或近球形, 高 2—3 毫米, 顶端圆形; 萼碟形, 边缘呈波状浅裂, 无毛; 花瓣 4, 卵圆形或卵椭圆形, 高 1.7—2.7 毫米, 无毛; 雄蕊 4, 花药卵圆形, 长宽近相等; 花盘明显, 4 浅裂; 子房下部与花盘合生, 花柱钻形, 柱头微扩大。果实近球形, 直径 0.5—0.6 厘米, 有种子 1 颗; 种子倒卵圆形, 顶端圆形, 基部短喙, 表面平滑, 种脐在种子背面基部与种脊无异, 种脊突出, 腹部中棱脊突出, 两侧洼穴在基部微凹陷。 花期 6—10 月, 果期 8—11 月。

产云南。生山坡或溪边林中, 海拔 900—1 400 米。越南也有分布。

7. 五叶白粉藤 图版 8: 7—12

Cissus elongata Roxb. Fl. Ind. **1**: 429. 1820 et ed. 2. **1**: 411. 1832. ——*Vitis elongata* (Roxb.) Wall. Num. List no. 6016. 1831—1832; Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 658. 1875. ——*Cayratia elongata* (Roxb.) Suesseng. in Mitt. Bot. Staatssamml. **1**: 352. 1953; Momiyama in Hara, Fl. East. Himal. **2**: 78. 1971.