

fam. ed. 2. 20d: 278. 1953.

本亚属我国有下列4种。

1. 膝曲乌藟莓 (海南植物志) 大麻藤果 (云南)

Cayratia geniculata (Bl.) Gagnep. in Lecomte; Not. Syst. 1: 345. 1911 et Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine. 1: 976. 1912; Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. Philadelphia. 24 (2): 256. 1935; 中国高等植物图鉴 2: 783. 1972; 海南植物志 3: 27. 图 543. 1974; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 91. 1979 in clavi; 云南种子植物名录上册 792. 1984. — *Cissus geniculata* Blume, Bijdr. Fl. Nederl. Ind. 184. 1825; Planch. in DC. Monogr. Phan. 5: 572. 1887. — *Columella geniculata* (Bl.) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 11: 132. 1916. — *Tetrastigma obovatum* auct. non Gagnep. (1910); 西藏植物志 3: 231. 1986.

本质藤本。小枝圆柱形，略扁压，被短柔毛。卷须2叉分枝，相隔2节间断与叶对生。叶为3小叶，中央小叶菱状椭圆形，长10—18厘米，宽5—9厘米，顶端尾尖或渐尖，稀急尖，基部楔形，侧生小叶阔卵形，长9—17厘米，宽4—9厘米，顶端尾尖或渐尖，基部不对称，斜圆形，边缘有疏离细锯齿，上面绿色，无毛，下面浅绿色，密被短柔毛或脱落几无毛；侧脉7—9对，网脉不明显；叶柄长9—18厘米，被短柔毛，小叶几无柄或有短柄；托叶早落。花序腋生，复二歧聚伞花序；花序梗长3—14厘米，被短柔毛；花梗长1—3毫米，被短柔毛；花蕾卵圆形或近球形，高约2毫米，顶端圆形；萼杯状，边缘呈波状浅裂，外面被乳突状毛；花瓣4，卵圆形，高1.5—2毫米，外面被乳突状毛；雄蕊4，花药卵圆形，长略甚于宽或长宽近相等；花盘发达，波状4浅裂；子房下部与花盘合生，花柱短，柱头略为扩大。果实近球形，直径0.8—1厘米，有种子2—4颗；种子半球形，顶端近圆形或微凹，基部有短喙，种脐在种子背面下部略比种脊宽，向上渐狭，种脊微突出，腹孔直径2—4毫米，边缘有突起肋纹。花期1—5月，果期5—11月。

产广东、广西、海南、云南、西藏。生山谷溪边林中，海拔300—1000米。越南、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚也有分布。

2. 心叶乌藟莓

Cayratia cordifolia C. Y. Wu in Chin. J. Appl. Environ. Biol. 2 (1): 49. 1996.

木质藤本。小枝圆柱形，有纵棱纹，密被短柔毛。卷须2叉分枝，相隔2节间断与叶对生。叶为3小叶，中央小叶倒卵椭圆形，侧生小叶阔椭圆形或菱状椭圆形，长12—25厘米，宽8—16厘米，顶端急尖或渐尖，基部微心形，边缘全缘或有不明显锯齿，上面绿色，密被短柔毛，下面浅绿色，密被灰色柔毛；侧脉9—12对，网脉不明显突出；叶柄长8.5—16厘米，中央小叶柄长6—7厘米，侧生小叶柄长2—3.5厘米，密被短柔毛；托叶早落。花序腋生，呈伞房状多歧聚伞花序；花序梗长约11厘米，中部有节；花梗长