

1—2.5 毫米，密被灰色短柔毛；花蕾近球形或卵球形，高 2—2.5 毫米，顶端圆形；萼碟形，边缘呈波状，无毛；花瓣 4，卵椭圆形，高 1.8—2.3 毫米，外面无毛；雄蕊 4，花药卵圆形，长宽近相等；花盘发达，4 浅裂；花柱微扩大。果实扁球形，直径约 1.3 厘米；种子半球形，顶端圆形，基部有短喙，种脐在种子背面中部呈梭形，上部种脊狭窄，腹孔椭圆形，长 5—6 毫米，宽约 4 毫米。花期 6 月，果期 10 月至翌年 1 月。

产云南。生山谷或山坡疏林中，海拔 100—1 100 米。模式标本采自云南屏边。

3. 狭叶乌荑莓 图版 11: 1

Cayratia mollissima (Wall.) Gagnep. var. *lanceolata* C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. 2 (1): 50. 1996.


木质藤本。小枝纤细，圆柱形，有纵棱纹，密被短柔毛。卷须不分枝或 2 叉分枝，相隔 2 节间断与叶对生。叶为 3 小叶，中央小叶披针形，长 6—14 厘米，宽 1.5—3 厘米，顶端长渐尖，基部楔形，稀近圆形，侧生小叶卵披针形，长 4.5—9.5 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，顶端长渐尖，基部不对称，近圆形，边缘有稀疏细锯齿，上面绿色，下面浅绿色，两面均伏生稀疏小刺毛，下面中脉上被疏长柔毛；侧脉 6—8 对，网脉不明显；叶柄长 2—3 厘米，中央小叶柄长 0.7—2 厘米，侧生小叶柄较短，长 0.3—0.9 厘米，被疏长柔毛；托叶早落。花序腋生，伞房状多歧聚伞花序；花序梗长 2—8 厘米，中部有节，节上有褐色包片，被短柔毛；花梗长 0.5—1 毫米，密被短柔毛；花蕾椭圆形，高 1—1.5 毫米，顶端圆形；萼碟形，萼齿不明显，外面被短柔毛；花瓣 4，卵椭圆形，高 0.8—1.3 毫米，无毛；雄蕊 4，花药卵圆形，长略甚于宽或长宽近相等；花盘发达，边缘呈波状浅裂；子房下部与花盘合生，花柱纤细，柱头不明显扩大。果实球形，直径 0.8—1 厘米，有种子 2—3 颗；种子半球形，顶端圆形，基部喙短，种脐在种子背面近中部，带状椭圆形，向上渐狭，表面光滑，上部种脊突出，腹孔圆形，直径约 2 毫米，边缘有助纹微突出。花期 4—5 月，果期 6—7 月。

产海南。生山坡灌丛。模式标本采自海南崖县。

本变种过去在标本室中被鉴定为膝曲乌荑莓 *C. geniculata* (Bl.) Gagnep.，但小枝纤细，直径 3—5 毫米，叶柄较短，仅长 2—3 厘米，叶质地较薄，干时薄膜质，叶片狭窄，披针形，叶片两面散生小刺毛，下面中脉上被疏长柔毛，而膝曲乌荑莓小枝较粗，直径通常 4—5 毫米，叶柄较长，长 8—15 厘米，叶质地较厚，纸质，长椭圆形或卵椭圆形，下面密被短柔毛，或老后变稀疏，作 *C. mollissima* (Wall. ex Roxb.) Gagnep. 的变种为宜。

4. 乌足乌荑莓 龙州乌荑莓 (广西植物) 七叶大麻藤 (云南种子植物名录) 图版 11: 2—6

Cayratia pedata (Lamk.) Juss. ex Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 1: 346. 1910; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 91. 1979 in clavi; 云南种子植物名录上册



图版 11 1. 狭叶乌荑莓 *Cayratia mollissima* (Wall.) Gagnep. var. *lanceolata* C. L. Li; 枝
 叶。2—6. 乌足乌荑莓 *Cayratia pedata* (Lamk) Gagnep.; 2. 花枝, 3. 花蕾, 4. 示花去花
 瓣, 5. 种子腹面观, 6. 种子背面观。(顾 健绘)