

伞花序；花序梗长 2—3 厘米，被短柔毛或几无毛；花梗长 3—4 毫米，疏生短柔毛；花蕾卵椭圆形，高 2—3 毫米，顶端圆钝；萼碟形，边缘呈波状，萼齿不明显，外面被短柔毛；花瓣 4，长椭圆形，高 1.8—2.8 毫米，顶端呈风帽状，外面被短柔毛；雄蕊 4，在雌花内雄蕊显著短而败育；花盘在雌花中不明显；子房圆锥形，被短柔毛，花柱短，柱头深 4 裂。果实球形，直径 1—1.3 厘米，有种子 1—2 颗；种子倒三角形，顶端微凹，基部渐狭，喙尖锐，种脐在种子背面中部向上呈带状长椭圆形，渐狭达种子顶端，两侧横肋尖锐突出，腹部中棱脊突出，两侧洼穴呈沟状，达中部时向上斜展达种子顶端，两侧横肋突出。花期 4—5 月，果期 6—10 月。

产云南。生山坡、河岸灌丛或林中，海拔 1 000—1 500 米。越南北部也有分布。

过去本种在标本室中我国有的学者曾鉴定为 *T. crassipes* Planch. 但经作者检查了巴黎自然历史博物馆藏模式标本后，发现本种为我国新记录。本种特点为疏散的聚伞花序，直径达 8—12 厘米，花瓣顶端无小角，子房被锈色短柔毛，很好识别。

34. 景东崖爬藤 (云南植物研究)

Tetrastigma jingdongensis C. L. Li in Acta Bot. Yun. 19 (3): 220. f. 2. 1997.

木质藤本。小枝圆柱形，有稀疏皮孔，纵棱纹明显，无毛。叶为鸟足状 7 小叶，小叶披针形，长 4—10 厘米，宽 1—2.5 厘米，每侧边缘有 5—11 个锯齿，上面暗绿色，下面浅绿色，两面均无毛；侧脉 5—9 对，网脉不明显；叶柄长 3—9 厘米，中央小叶柄 0.5—0.8 厘米，侧生小叶柄极短或近无柄，侧生小叶总柄 0.3—0.8 厘米，无毛。花序长 5—18 厘米，腋生，在侧枝上通常与叶对生，二级分枝 3—4，成伞状集生，三级以后分枝成近伞状；花序梗长 3.5—9 厘米，无毛；花梗长 1.5—2 毫米，无毛；花瓣 4，长椭圆形或卵圆形，高 1—2 毫米，顶端圆形或钝，无毛；雄蕊 4，花丝丝状，花药黄色，卵圆形，长宽近相等，在雌花内败育；花盘在雌雄花中均发达，4 浅裂；子房下部与花盘合生，花柱不明显，柱头扩大，浅 4 裂。花期 6—7 月。

产云南。生沟谷林中，海拔 2 000—2 100 米。模式标本采自景东。

35. 七小叶崖爬藤 (植物分类学报)

Tetrastigma delavayi Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 1: 378. 1911; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17(3): 95. 1979 in clavi et 中国高等植物图鉴补编 2: 363. 1983 in clavi et in Guihaia 8 (2): 118. 1988; 云南种子植物名录上册 798. 1984. — *Tetrastigma delavayi* Gagnep. f. *majus* W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 83. 1979; 中国高等植物图鉴补编 2: 363. 1983 in clavi; 云南种子植物名录上册 799. 1984.

木质藤本，茎多瘤状突起。小枝圆柱形，皮孔明显，有纵棱纹，无毛。卷须二叉分枝，相隔 2 节间断与叶对生。叶为鸟足状 7—8 小叶，中央小叶倒卵长椭圆形或披针形，长 8—15 厘米，稀长达 21 厘米，宽 2—7 厘米，侧生小叶长 2.5—15 厘米，每侧边缘有 5—15 个锯齿，上面暗绿色，下面浅绿色，两面均无毛；侧脉 5—9 对，网脉不明显；叶