

puberulum W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 83. 1979.

本变种与原变种区别在于，花序轴与花梗被微柔毛。花期 10 月，果期 11 月至翌年 2 月。

产云南、西藏。生溪边灌丛或林中，海拔 1 300—2 100 米。模式标本采自云南景东。

42. 狭叶崖爬藤 (植物分类学报)

Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. in DC. Monogr. Phan. 5: 432. 1887 p. ; Franch. Fl. Delav. 139. 1890; Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 1: 322. 1911; 西藏植物志 3: 231. 图版 96: 1—2. 1986. —*Cissus serrulata* Roxb. Fl. Ind. 1: 432. 1820. —*T. hypoglaucum* auct. non Planch. ex Franch. (1886); 中国高等植物图鉴 2: 786. 图 3301. 1972; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 96. 1979 in clavi et in Guihaia 8 (2): 117. 1988; 中国高等植物图鉴补编 2: 364. 1972 in clavi; 云南种子植物名录上册 799. 1984; 西藏植物志 3: 231. 图 96: 3—4. 1986.

42a. 狭叶崖爬藤 (原变种)

T. serrulatum (Roxb.) Planch. var. *serrulatum*

草质藤本。小枝纤细，圆柱形，有纵棱纹，无毛。卷须不分枝，相隔 2 节间断与叶对生。叶为鸟足状 5 小叶，小叶卵披针形或倒卵披针形，长 1.5—9 厘米，宽 0.5—3 厘米，顶端尾尖、渐尖或急尖，基部圆形或阔楔形，侧小叶基部不对称，边缘常呈波状，边缘每侧有 5—8 个细锯齿，齿长约 1 毫米，常着生波形凹处，上面绿色，下面浅绿色，两面无毛；侧脉 4—8 对，网脉两面明显突出；叶柄长 1—5.5 厘米，中央小叶柄长 0.5—1.3 厘米，侧生小叶总柄长 0.2—1 厘米，侧小叶柄短或近无柄，无毛。花序腋生，长 1—8 厘米，比叶柄短、近等长或较叶柄长，下部有节和苞片，或在侧枝上与叶对生，下部无节和苞片，二级分枝 4—5，集生成伞形；花序梗长 1—5 厘米，无毛；花梗长 2—4 毫米，无毛或几无毛；花蕾卵椭圆形，高 2—4 毫米；萼细小，齿不明显，无毛；花瓣 4，卵圆形，顶端有小角，外展，无毛；雄蕊 4，花丝丝状，花药黄色，卵圆形，长宽近相等，在雌花内雄蕊显著短而败育；花盘在雄花中明显，4 浅裂，在雌花中呈环状；子房下部与花盘合生，花柱短，柱头呈盘形扩大，边缘不规则分裂。果实圆球形，紫黑色，直径 0.8—1.2 厘米，有种子 2 颗；种子倒卵椭圆形，顶端近圆形，基部渐狭成短喙，种脐在种子背面下部向上呈狭带形，下端略呈龟头状，腹部中棱脊突出，两侧洼穴呈沟状，从基部向上斜展达种子顶端，两侧边缘有横肋。花期 3—6 月，果期 7—10 月。

产湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。生山谷林中、山坡灌丛岩石缝中，海拔 500—2 900 米。模式标本采自云南宾川。

42b. 毛狭叶崖爬藤 (植物分类学报) (变种)

T. serrulatum (Roxb.) Planch. var. *pubinervium* C. L. Li. var. nov. —*T. serrulatum* (Roxb.) Planch. var. *puberulum* (W. T. Wang et Cao) C. L. Li in Chin.