

1.5 毫米,花药黄色,椭圆形,长约 4 毫米;花盘发达,5 裂;雌蕊在雄花中退化。花期 5 月。

产陕西南部、湖北西部。生山坡林中或林缘,海拔 300—1 200 米。模式标本采自湖北西部。

本种的形态变异主要表现在叶片的分裂程度上,规则或不规则 3—5 浅裂或深裂,这种变异常在同一个体植株上见到。

16. 武汉葡萄 (应用与环境生物学报) 图版 26: 1—7

*Vitis wuhanensis* C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. 2 (3): 243. 1996.

木质藤本。小枝细瘦,圆柱形,有纵棱纹,疏被蛛丝状绒毛。卷须不分枝,每隔 2 节间断与叶对生。叶卵形或卵圆形,长 3—7 厘米,宽 2.5—6 厘米,3 浅裂或不明显 3—5 裂,顶端急尖或渐尖,基部心形,每侧边缘有 5—13 个粗锯齿,上面绿色,无毛,下面苍白色,嫩时疏被蛛丝状绒毛,以后脱落无毛,基生脉 5 出,中脉有侧脉 4—5 对,网脉在果时两面突出;叶柄长 1.5—4 厘米,初时疏被蛛状丝绒毛,以后落无毛;托叶膜质,褐色,椭圆披针形,长 2.5—3.5 毫米,宽 1—1.5 毫米,顶端钝或急尖,边缘全缘,无毛。花杂性异株;圆锥花序狭窄,与叶对生,长 2.5—4 厘米,下部分枝不发达,花序梗长 1.5—2.5 厘米,疏被蛛丝状绒毛;花梗长 2—3 毫米,无毛;花蕾倒卵椭圆形,高 1.5—2.5 毫米,顶端圆形;萼碟形,几全缘,高约 2 毫米;花瓣 5,呈帽状粘合脱落;雄蕊 5,花丝丝状,长 1.2—1.8 毫米,花药黄色,椭圆形,长约 0.5 毫米;花盘发达,5 裂;雌蕊在雄花中退化。果实球形,直径 0.6—0.7 厘米;种子倒卵椭圆形,顶端微凹,基部有短喙,种脐在种子背面中部呈椭圆形,腹面中棱脊突起,两侧洼穴狭窄呈条形,向上达种子近顶端。花期 4—5 月,果期 5—7 月。


产河南(信阳)、湖北、江西。生山坡、沟谷灌丛或地边树荫下,海拔 300—700 米。模式标本采自湖北武汉。

本种主要生长在长江中游夏季炎热地区。本种过去与湖北葡萄 *V. silvestrii* Pamp. 相混,但本种卷须不分枝,小枝、叶柄和叶下面不被短柔毛,无毛或疏生蛛丝状绒毛,网脉在果期干时两面显著突出,很好区别。本种也易和小叶葡萄 *V. sinocinerea* W. T. Wang 相混,但后者嫩枝、叶柄和花序梗或多或少被短柔毛,叶片下面密被蛛丝状绒毛,果期干时叶片网脉不明显突出,可以区别。

17. 温州葡萄 (植物分类学报) 图版 28: 1—2

*Vitis wenchouensis* C. Ling ex W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 74 et 85. 图 1: 4. 1979.

木质藤本。小枝纤细,有纵棱纹,无毛。卷须不分枝,每隔 2 节间断着生。叶为三角状戟形或三角状长卵形,不分裂或 3—5 浅裂,分裂者裂缺成钝角或锐角,长 4—9.3 厘米,宽 2.8—4.5 厘米,顶端长渐尖,基部呈心形,基缺凹成锐角,边缘每侧有不整齐 7—



图版 26 1—7. 武汉葡萄 *Vitis wuhanensis* C. L. Li; 1. 花枝, 2. 花蕾, 3. 示雄花去花瓣, 4. 种子腹面观, 5. 种子背面观, 6. 种子横切面, 7. 叶片. 8—9. 美丽葡萄 *Vitis bellula* (Rehd.) W. T. Wang; 8. 花枝, 9. 示叶背放大. 10—13. 庐山葡萄 *Vitis hui* Cheng; 10. 花枝, 11. 示叶背放大, 12. 示叶表面放大, 13. 示茎部放大. 14—15. 小叶葡萄 *Vitis sinocinerea* W. T. Wang; 14. 叶枝, 15. 示叶背放大. (顾 健绘)