

端圆形，微下凹，基部有短喙，种脐在种子背面近中部呈圆形，腹部中棱脊突出，两侧洼穴呈沟状，向上达种子近顶端。花期5—6月，果期7—8月。

产湖北、四川。生山坡林缘或灌丛中，海拔1300—1600米。模式标本采自湖北西部。

33b. 华南美丽葡萄 (变种)

V. bellula (Rehd.) W. T. Wang var. *pubigera* C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. 2 (3): 251. 1996. — *V. pentagona* Diels & Gilg var. *bellula* auct. non Rehd. (1917); Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 678. 1933.

本变种与原变种的区别在于，花序轴被稀疏短柔毛，叶大多为卵状三角形，可以区别。花期5月，果期6—8月。

产湖南、广东、广西。生山坡林缘、崖石或灌丛，海拔400—1500米。模式标本采自广西花坪。

34. 麦黄葡萄 (西北农业大学学报)

Vitis bashanica He P C in Acta Univ. Agric. Boreali-occidentalis. 23 (5): 121. 1995.

木质藤本。小枝纤细，圆柱形，有纵棱纹，疏被白色蛛丝状绒毛和短柔毛；卷须不分枝或2叉分枝，相隔2节间断与叶对生。叶卵圆形或卵椭圆形，长5.5—6.9厘米，宽3.6—4.8厘米，顶端渐尖，基部截形，边缘每侧有7—12个细锐锯齿，上面绿色，脉上伏生稀疏短柔毛，下面密被灰白色绒毛，脉上被疏柔毛；基生脉5出，中脉有侧脉3—4对，网脉两面均不明显突出；叶柄长1.6—3厘米，被稀疏蛛丝状绒毛和短柔毛；托叶早落。圆锥花序长约3.6厘米，花序梗长约1.2厘米。果实近球形，成熟时紫黑色，直径约0.7厘米，紫黑色。果期8月。

产陕西（白河银坊村）。海拔约325米。模式标本采自陕西白河。

本种记载不完整，标定的主模式标本无花果，但作者认为本种小枝、叶柄和叶脉上被柔毛，与美丽葡萄 *V. bellula* (Rehd.) W. T. Wang 相区别，可以成立。

35. 庐山葡萄 (植物分类学报) 图版 26: 10—13

Vitis hui Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China. 10: 78. f. 11. 1935; Sues-seng. in Pflanzenfam. ed. 2. 20d: 293. 1953; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 86. 1979 in clavi.

木质藤本。在开扩地常呈披散状灌木。小枝圆柱形，有纵棱纹，密被短柔毛和疏被蛛丝状绒毛。卷须不分枝或混生有2分枝，每隔2节间断与叶对生，常因发育不良早萎缩。叶卵圆形或卵椭圆形，长3—5.5厘米，宽2—4厘米，顶端急尖或渐尖，基部心形，基缺凹成钝角，边缘每侧有尖锐锯齿，上面暗绿色，密被短柔毛及稀疏蛛丝状绒毛，下面密被灰色蛛丝状绒毛；基生脉5出，中脉有侧脉4—5对，脉上密被短柔毛和疏生蛛丝