

序梗长 0.5—2.5 厘米, 初时被蛛状丝绒毛, 以后变稀疏; 花梗长 1.5—3 毫米, 无毛; 花蕾倒卵椭圆形或近球形, 高 1.5—2.2 毫米, 顶端圆形; 萼碟形, 高约 0.2 毫米, 近全缘, 无毛; 花瓣 5, 呈帽状粘合脱落; 雄蕊 5, 花丝丝状, 长 1.5—1.8 毫米, 花药黄色, 椭圆形, 长 0.4—0.5 毫米, 在雌花内雄蕊短而不发达, 败育; 花盘发达, 5 裂; 雌蕊 1, 子房椭圆卵形, 花柱细短, 柱头扩大。果实球形, 成熟时紫红色, 直径 0.5—0.8 厘米; 种子倒卵形, 顶端微凹, 基部有短喙, 种脐在种子背面中部呈圆形或椭圆形, 腹面中棱脊突出, 两侧洼穴狭窄, 向上达种子 3/4 处。花期 4—8 月, 果期 6—10 月。

产河北、陕西、山西、山东、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、四川、云南。生山谷林中、灌丛、沟边或田埂, 海拔 150—2 500 米。模式标本采自北京。

本种变异主要表现在叶分裂式样极为多变, 植株毛被种类变异不定, 有时多为绒毛或混生有柔毛, 稀绒毛脱落变稀疏而柔毛较多。此外, 过去的学者仅依据绒毛颜色相异和南北分布不同而定为不同的种 *V. adstricta* Hance 或变种 *V. bryoniaefolia* Bge. var. *mairei* (Lévl.) W. T. Wang, 据作者研究, 这种绒毛颜色的变化从北到南有一定的规律, 在模式产区江苏、安徽一带两种颜色都有, 实不能作为分类的依据。由于本种分布广泛, 南北气候跨度大, 垂直分布可从低海拔到较高海拔, 因此表现种内多形, 但本种叶多深裂, 叶片下面被蛛丝状绒毛, 与本属其他种类很好区别。产于华北的群体有较强的抗寒和抗霜霉病的能力; 全株供药用, 能祛风湿、消肿痛, 藤可造纸, 果可酿果酒。

37b. 三出夔夔 (植物分类学报) (变种)

V. bryoniaefolia Bge. var. *ternata* (W. T. Wang) C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. 2(3): 253. 1996. —*V. adstricta* Hance var. *ternata* W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 76 & 87. 图版 1: 1. 1979.

本种与原变种区别主要在于, 本变种叶为 3 小叶或 3—5 深裂, 叶片下面绒毛稀疏。产浙江。模式标本采自浙江杭州。

38. 鸡足葡萄 狭复叶葡萄 (广西植物)

Vitis lanceolatifolia C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. 2 (3): 253. 1996. —*V. piasezkii* Maxim. var. *angustata* W. T. Wang in Guihaia 8 (2): 112. 1988.

木质藤本。小枝圆柱形, 有纵棱纹, 密被锈色蛛丝状绒毛。卷须 2 叉分枝, 每隔 2 节间断与叶对生。叶为掌状 3—5 小叶, 中央小叶带状披针形, 稀长椭圆形或倒卵披针形, 长 3.5—9 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形, 边缘每侧有 5—6 个波状细牙齿, 侧生小叶卵披针形, 长 3—8 厘米, 宽 1.2—3 厘米, 顶端渐尖, 基部不对称, 斜楔形或斜圆形, 外侧有 6—11 个细牙齿, 不分裂或基部 2 裂, 上面深绿色, 初时疏被蛛丝状绒毛, 以后脱落, 仅中脉被极短的柔毛, 下面密被褐色蛛丝状绒毛; 侧脉 3—5 对, 网

脉不明显；叶柄长 3—5 厘米，密被褐色蛛状丝绒毛；托叶近膜质，深褐色，椭圆形，长 1.8—2.5 毫米，宽 1—1.3 毫米，顶端急尖，边缘全缘，无毛或近无毛。圆锥花序疏散，与叶对生，分枝发达，花序梗长 4—8 厘米，密被锈色蛛丝状绒毛；花梗长 1—1.3 毫米，几无毛；花蕾倒卵圆形，高 1.7—2.8 毫米，顶端圆形；萼碟形，萼齿不明显；花瓣 5，呈帽状粘合脱落；雄蕊 5，花盘发达，5 裂；雌蕊 1，子房卵圆形，花柱短，柱头微扩大。果实球形，直径 0.8—1 厘米；种子倒卵圆形，顶端近圆形，基部有短喙，种脐在种子背面中部呈椭圆形，种脊突出，腹面中棱脊突起，两侧洼穴呈宽沟状，向上达种子 1/3 处。花期 5 月，果期 8—9 月。

产江西、湖南、广东。生山坡、溪边灌丛或疏林，海拔 600—800 米。模式标本采自湖南黔阳。

本种与麦黄葡萄 *V. bashanica* He P C 相近，但本种各部密被锈色绒毛，叶多混生有 5 小叶，有时小叶再深裂稀呈 2 回羽状复叶，中央小叶多呈披针形，有明显较长的叶柄，分布在长江下游以南，因其小叶有时分裂较深，故当地人称鸡足葡萄。