

petiolata Jack Malay Misc. 1(5):43. 1840.

乔木,高12米;嫩枝无毛,常有红色树脂渗出树皮及枝条表面。叶革质,长卵形或椭圆形,长9—18厘米,宽4—7厘米,先端急短尖,尖头钝,稀为渐尖,基部圆形或钝,上面深绿色,略有光泽,下面无毛,侧脉5—7对,在上面明显能见,在下面显著突起,网脉明显,边缘有浅波状小钝齿,或为全缘;叶柄长3—6厘米,稍粗壮,秃净无毛。总状花序腋生,长6—12厘米,花序轴被柔毛;花柄长10—15毫米,略被短柔毛;萼片5片,披针形,长6—7毫米,外侧被柔毛;花瓣与萼片等长,长圆形,外侧被褐色毛,上半部撕裂,裂片9—14条;雄蕊约30枚,被短柔毛,花药先端有芒刺,常向外弯斜;花盘10裂,无毛;子房2室,无毛,花柱无毛。核果椭圆形,长1.5厘米,宽9毫米,内果皮骨质,表面有浅沟纹,1室,种子长约1厘米。花期8—9月。

产于广东、广西及云南。生于低海拔的热带森林里。中南半岛和马来西亚也有分布。

本种外形近似日本杜英 *E. japonicus* Sieb. et Zucc., 只是叶片较大,花瓣撕裂。花药顶端有芒刺,子房只有2室,且秃净无毛,与后者容易区别。

6. 屏边杜英(植物分类学报)

Elaeocarpus subpetiolatus H. T. Chang in Acta Phytotax. Sin. 17:57. 1979.

乔木;嫩枝有短绢毛。叶革质,长圆形,长10—13厘米,宽4—5.5厘米,先端急尖,尖头钝,基部楔形,上面深绿色,稍发亮,下面浅绿色,初时有绢毛,不久变秃净,侧脉约10对,边缘有细钝齿;叶柄长2—3厘米,稍纤弱。花序腋生,长2—4厘米,有花3—7朵;苞片细小,早落;花柄长5毫米;花蕾长7毫米;萼片披针形,外面有微毛;花瓣狭长圆形,比萼片略短,先端12裂,裂片长2毫米,外面有毛;雄蕊30枚,长4—5毫米,顶端有短芒刺;花盘10裂,有毛;子房3室,有毛,花柱比雄蕊短。花期4月。

产于云南南部屏边。生长于海拔1400米以下的森林中。模式标本采自云南屏边。

本种和长柄杜英 *E. petiolatus* Wall. 较接近,但叶片较小,叶柄倍短,子房3室,被毛而不同。

7. 樱叶杜英(新拟)

Elaeocarpus prunifolioides Hu in Bull. Fan. Men. Inst. Biol. Bot. 10: 138. 1940.

7a. 樱叶杜英(原变种)

var. *prunifolioides*

乔木,高15米;嫩枝及顶芽均秃净无毛,干后变黑褐色。叶薄革质或纸质,长圆形或卵状长圆形,长8—13厘米,宽3—6厘米,长圆形的叶常短于10厘米,先端尖,尖头钝,基部阔楔形或近于圆形,多少不等侧,上面深绿色,发亮,干后黑褐色有光泽,或为灰绿色暗晦无光,下面浅绿色,侧脉8—9对,在上面明显,在下面突起,网脉在上下两面均明显,边缘有小钝齿;叶柄长2—4厘米,干后常变黑色。总状花序生于当年枝的叶腋内,长4—6厘