

Elaeocarpus bachmaensis Gagnep. in Lecemte, Not. Syst. 11:1. 1943, et in Humbert. Suppl. Fl. Indo-Chine 1:483, fig. 57:1—5. 1945.

乔木, 高 15 米; 嫩枝纤细, 顶端有短柔毛, 不久变秃净。叶膜质, 披针形或狭窄长圆形, 长 10—14.5 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 先端渐尖或尾状渐尖, 基部楔形, 上面深绿色, 干后淡褐色, 暗晦无光泽, 下面浅绿色, 无毛, 侧脉 8—10 对, 在上面明显, 在下面突起, 网脉纤细, 在上下两面都很明显, 边缘有小钝齿; 叶柄长 1.5—2.5 厘米, 纤细, 无毛。总状花序腋生, 纤弱, 长 4—5 厘米, 有花数朵, 花序轴被毛; 花柄长 7 毫米, 被毛; 花蕾被灰白色毛, 卵形, 长 5 毫米; 萼片 5 片, 披针形, 长 6 毫米, 被毛; 花瓣 5 片, 上部 1/4 撕裂, 裂片 6 条, 外面及边缘被毛; 雄蕊多数, 花丝短, 无毛, 花药长 3—4 毫米, 顶端的芒刺长 1 毫米; 花盘 5 裂, 每个再 2 裂, 无毛; 子房被毛, 3—4 室, 花柱长 4—5 毫米, 被毛。核果椭圆形, 长 1—1.2 厘米, 无毛, 内果皮骨质, 厚约 1 毫米, 表面无沟纹。 花期 4—5 月。

产于云南东南部。越南有分布。本种的模式标本采自越南南部。

从原始记载关于花的特征看来, 本种和樱叶杜英 *E. prunifolioides* Hu 非常接近, 只是本种的叶片为狭窄长圆形, 叶柄极短, 嫩枝及顶芽有短柔毛, 花瓣先端只有 6 裂, 花盘 5 裂, 每个裂片再 2 叉分裂。

10. 老挝杜英(新拟)

Elaeocarpus laoticus Gagnep. in Lecemte, Not. Syst. 11:7. 1943, et in Humbert. Suppl. Fl. Gen. Indo-Chine 1:485. 1945.

乔木, 高达 30 米; 嫩枝有短柔毛, 很快变秃净。叶薄革质, 狭窄披针形或倒披针形, 长 10—13 厘米, 宽 2.5—3.5 厘米, 先端略尖, 尖头钝, 基部阔楔形或稍钝, 上面深绿色, 发亮, 干后暗褐色, 下面棕绿色, 在中脉上有残留的短柔毛, 侧脉约 10 对, 与网脉在上面能见, 在下面突起, 边缘有小钝齿; 叶柄长 1—2 厘米, 多少有微毛。总状花序生于当年枝的叶腋内, 长 4—6 厘米, 有花 7—10 朵, 花序轴有褐色柔毛; 花柄长 6—7 毫米; 萼片 5 片, 狭窄披针形, 长 8—9 毫米, 宽 2 毫米, 外面有灰白色柔毛; 花瓣长 10 毫米, 背面有毛, 上半部撕裂, 裂片 17—20 条, 内侧多白色长毛; 雄蕊 22 枚, 长 5 毫米, 花药长 3 毫米, 顶端有芒刺长约 1 毫米, 花丝长不过 1 毫米; 花盘 10 裂, 明显分裂, 腺体球形, 有疏柔毛; 子房 3 室, 被毛, 花柱长 5—6 毫米, 下半部有微毛。核果未见。 花期 5—7 月。

产于云南金屏。生长于中海拔的常绿林里。老挝有分布。本种模式标本采自老挝川矿 (Xiang-Kuang)。

11. 显脉杜英 拟杜英(海南植物志) 图版3: 1—5

Elaeocarpus dubius A. DC. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. 3: 366. 1903; Gagnep. in Lecemte, Fl. Gen. Indo-Chine 1:572. 1911; Merr. in Pilip. Journ. Sci. 15: 246. 1919, in Lingn. Sci. Journ. 13:62. 1934; 海南植物志 2: 70. 1965. — *Elaeocarpus griffithii* auct. non Mast.: Dunn et Tutch. in Rep. Bot. For. Hongk. 1914:30.